

واکسن‌های من

مرکز بهداشت کودک و خانواده توصیه می‌کند که از جدول زمانی اولیه کامل پیشنهاد شده توسط شورای عالی سلامت پیروی کنید. بیشتر واکسن‌ها رایگان هستند. مطابق قانون واکسیناسیون پولیو اجباری است. می‌توانید در یک کلینیک سلامت مرکز بهداشت کودک و خانواده، در مطب پزشک خانواده یا پزشک اطفال فرزندان را واکسن بزنید. پزشک یا پرستار در اینجا و در ثبت آنلاین می‌نویسد که کودکان کدام واکسن‌ها را زده است.

15 ماه	12 ماه	واکسیناسیون در برابر	16 هفته	12 هفته	8 هفته	واکسیناسیون در برابر
چنانچه سن بارداری کمتر از 37 هفته باشد، زمان واکسن‌ها از 15 ماهگی به 13 ماهگی تغییر می‌کند.		واکسن ترکیبی پولیو (فلج اطفال) دیفتری (خروسک) کزاز (فشل شدن فک) پرتوزیس (سیاه سرفه) هپاتیت ب (یرقان) هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب (مننژیت)				واکسن ترکیبی پولیو (فلج اطفال) دیفتری (خروسک) کزاز (فشل شدن فک) پرتوزیس (سیاه سرفه) هپاتیت ب (یرقان) هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب (مننژیت)
		پنوموکوک (مننژیت + پنومونی)		دوز اضافی برای توزادان نارس		پنوموکوک (مننژیت + پنومونی) در سن بارداری کمتر از 37 هفته، یک دوز اضافی در سن 12 هفته تجویز می‌شود.
		واکسن ترکیبی سرخک اوریون (گوشک) سرخچه (سرخک آلمانی)				روتاویروس (گاستروانتریت) واکسن روتاویروس به صورت خوراکی تجویز می‌شود و هزینه آن با نسخه پزشک حدود 12 یورو است. در بچه‌ها (2 تا 8 درجه سلسیوس) نگهداری شود. بسته به برند، 2 یا 3 دوز مصرف می‌شود.
		مننگوکوک ACWY (مننژیت)				

در این سن قابل تجویز نیست.

فقط هزینه واکسن‌های دارای این نماد باید پرداخت شود. بقیه رایگان هستند.