




# Vaksinimet e mia

Agjencia për Fëmijën dhe Familjen rekomandon ndjekjen e **skemës bazë të plotë** të sugjeruar nga Këshilli Superior Shëndetësor. Shumica e vasinave janë **falas**. Vaksinimi **për poliometilitin është i detyruar me ligj**. Fëmija juaj mund të vaksinohet **në një klinikë shëndetësore të Agjencisë për Fëmijën dhe Familjen**, në zyrën e mjekut të familjes apo në zyrën e pediatrit. Mjeku apo infemierja do të vendos një shënim këtu dhe në rekordin online se çfarë vaksinash ka marrë fëmija juaj dhe kohën kur i ka marrë ato.

Vaksinimet ndaj	8 javësh	12 javësh	16 javësh	Vaksinimet ndaj	12 muajsh	15 muajsh
 <b>VAKSINË E KOMBINUAR</b> <b>poliomelilit</b> (paraliza infantile) <b>difterisë</b> (krup – gryka e pezmatuar) <b>tetanosi</b> (sharrëza) <b>pertusi</b> (kolla e mirë) <b>hepatiti B</b> (verdhëza) <b>haemophilus influenzae e llojit b</b> (meningiti)				 <b>VAKSINË E KOMBINUAR</b> <b>poliomelilit</b> (paraliza infantile) <b>difterisë</b> (krup – gryka e pezmatuar) <b>tetanosi</b> (sharrëza) <b>pertusi</b> (kolla e mirë) <b>hepatiti B</b> (verdhëza) <b>haemophilus influenzae e llojit b</b> (meningiti)		
 <b>pneumokoku</b> (meningiti + pneumonia) Në një moshë shtatzënie <b>më pak se 37 javë</b> , do të administrohet <b>një dozë shtesë në moshën 12 javëshe</b> .		Dozë shtesë për foshnjat premature		 <b>pneumokoku</b> (meningiti + pneumonia)		
 <b>rotavirusi</b> (gastroenteriti) Vaksina e rotavirusit administrohet nga goja dhe kushton rreth <b>€12 me rekomandim mjeku</b> . Të ruhet në frigorifer (2-8°C). Duhet 2 ose 3 doza, në varësi të markës prodhuese.				 <b>VAKSINË E KOMBINUAR</b> <b>fruthi</b> <b>parotiti</b> (shytat) <b>rubela</b> (fruthi gjerman)		
				 <b>meningokoku ACWY</b> (meningiti)		

 Vetëm vaksinat me këtë ikonë duhet të paguhen. Të gjithë vaksinat e tjera janë falas.  Nuk aplikohet në këtë moshë.