












Mis vacunaciones


La Oficina para la Infancia y las Familias recomienda seguir **el programa básico completo** sugerido por el Consejo Superior de Salud. La mayoría de estas vacunas son **gratuitas**. La **vacunación contra la polio es obligatoria por ley**. Puede vacunar a su hijo **en la clínica de la Oficina para la Infancia y las Familias**, en la consulta del médico de familia o en la consulta del pediatra. El médico o la enfermera anotarán aquí y en el registro en línea qué vacunas ha recibido su hijo y cuándo.

15 meses
Si la edad gestacional es inferior a 37 semanas, las vacunas se adelantan de los 15 meses a los 13 meses.

Vacunaciones contra	8 semanas	12 semanas	16 semanas
 <p>VACUNA COMBINADA polio (parálisis infantil) difteria (crup) tétanos (trismo) pertusis (tos ferina) hepatitis B (ictericia) haemophilus influenzae tipo b (meningitis)</p>			
 <p>neumococo (meningitis + neumonía) A una edad gestacional inferior a 37 semanas, se aplicará una dosis adicional en la semana 12.</p>		Dosis adicional para bebés prematuros	
 <p>rotavirus (gastroenteritis) La vacuna contra el rotavirus se administra por vía oral y cuesta aprox. 12 € en una consulta médica. Conservar en el frigorífico (2-8 °C). Se necesitan 2 o 3 dosis, dependiendo de la marca.</p>			

Vacunaciones contra	12 meses	15 meses
 <p>VACUNA COMBINADA polio (parálisis infantil) difteria (crup) tétanos (trismo) pertusis (tos ferina) hepatitis B (ictericia) haemophilus influenzae tipo b (meningitis)</p>		
 <p>neumococo (meningitis + neumonía)</p>		
 <p>VACUNA COMBINADA sarampión papera (parotiditis) rubéola (sarampión alemán)</p>		
 <p>meningococos ACWY (meningitis)</p>		

 Solo se deben pagar las vacunas con este icono. Las demás son gratuitas.

 No aplicable a esta edad.