

¿Cómo debe actuar si alguien en su hogar tiene FIEBRE?

¿Cuándo le debe medir la temperatura?¹



Si tienen una temperatura de 38°C² o superior

OBSERVACIÓN PRECISA

Esté atento si su hijo ha perdido apetito, no bebe, tiene fiebre o los pañales están más húmedos (diarrea), y observe si su color de piel sigue siendo correcto, si puede respirar con normalidad, si su lloro es normal, si está activo o muy quieto, si tiene dolor en alguna parte del cuerpo y si se mantiene en alerta cuando está despierto

SIGNOS PREOCUPANTES

- manchas de sangre azules-rojas en la piel³
- color de piel gris
- somnoliento o dificultad para levantarse
- confusión
- dificultad para respirar, gemidos

SÍ

Llame inmediatamente al 112 o póngase en contacto urgentemente con su médico

NO

niño menor de 3 meses⁴

niño mayor de 3 meses

póngase en contacto con su médico hoy mismo

SÍ

¿Está usted preocupado⁵ o el niño presenta signos graves como deshidratación o una erupción cutánea que se extiende rápidamente?

NO

Vuelva a medirle la temperatura al cabo de una hora



Si el niño presenta signos de malestar⁶ le puede dar una dosis de paracetamol⁷



Lea más información acerca de la fiebre en kindengezin.be

Ver el otro lado →

Pies de página :

1. Debe medirle la temperatura corporal si usted está preocupado y si el niño no tiene un comportamiento normal, duerme más o menos horas de las habituales, tiene más o menos apetito, presenta dificultades, juega menos o nada, llora más o está pálido.
2. En los niños hasta 3 años de edad, mida la temperatura rectal.
3. Manchas puntiformes subcutáneas en los brazos, las piernas o el tronco que no desaparecen al presionarlas: esto indica septicemia y que se está desarrollando una infección muy grave
4. Menor de 90 días.
5. Posibles causas de preocupación: si el niño tiene alguna otra enfermedad o está más enfermo de lo habitual, si el niño está empeorando cada vez más o si el niño ha tenido fiebre durante más de 3 días seguidos.
6. Signos de malestar: lloroso, dolor, malestar, menos apetito, menos activo.
7. Una dosis de jarabe de paracetamol de acuerdo con el peso del niño. En casos excepcionales, se deben tomar otras medidas de acción después de consultarlo con un médico.