

Ce trebuie să faceți dacă cineva din gospodăria dumneavoastră are FEBRĂ

Când ar trebui să îi măsurați temperatura?¹



Dacă temperatura sa este de 38°C² sau mai mult²

OBSERVAȚIE CORECTĂ

Fiți foarte atenți când copilul dumneavoastră are un apetit scăzut, nu vrea să bea, are mai puține sau mai multe scutece umede (diaree) și observați dacă pielea sa are o culoare normală, dacă respiră normal, dacă plânsul este normal, dacă este activ sau foarte liniștit, dacă are dureri și dacă rămâne alert când este treaz

SEMNE DE ÎNGRIJORARE

- pete de sânge albastru-roșii pe piele³
- culoare gri a pielii
- somnolență sau dificultăți de trezire
- stare de confuzie
- dificultăți de respirație, gemete

DA

NU

Sunați imediat la 112 sau contactați de urgență un medic

copil cu vârsta mai mică de 3 luni⁴

copil mai mare de 3 luni

contactați un medic astăzi

DA

Sunteți îngrijorați⁵ sau există semne grave, cum ar fi deshidratarea sau o erupție cutanată care se răspândește rapid?

NU

Măsurați din nou temperatura după o oră



Dacă există semne de disconfort⁶ puteți administra o doză de paracetamol⁷



Citiți mai multe despre febră pe kindengezin.be

Vedeți pe partea cealaltă →

Note de subsol:

1. Ar trebui să măsurați temperatura corpului în cazul în care sunteți îngrijorați și în cazul în care copilul nu se comportă normal, doarme mai puțin sau mai mult, are mai puțină poftă de mâncare sau nu are deloc, are un comportament dificil, se joacă mai puțin sau deloc, plânge mai mult sau este palid.
2. Măsurați temperatura copilului pe cale rectală până la vârsta de 3 ani.
3. Pete subcutanate, în formă de vârf de ac, pe brațe, picioare sau pe trunchi, care nu dispar la apăsare: acest lucru indică septicemie și faptul că se dezvoltă o infecție foarte gravă
4. Mai mic de 90 de zile.
5. Posibile motive de îngrijorare: copilul prezintă alte simptome sau se simte mai rău decât de obicei, se simte din ce în ce mai rău sau a avut febră mai mult de 3 zile la rând.
6. Semne de disconfort: lăcrimare, durere, disconfort, apetit redus, mai puțin activ.
7. O doză de sirop de paracetamol, în funcție de greutatea copilului. În cazuri excepționale, poate fi urmat un alt curs de acțiune după consultarea unui medic.