

ПРИВИВКИ
ОБЩАЯ СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИВИВОК

Russische vertaling uit het Nederlands van: 'Vaccinatieschema'

September 2011

Прививка против	8 недель	12 недель	16 недель	12 месяцев	15 месяцев	5-7 лет ⁽¹⁾	10-13 лет	14-16 лет ⁽⁴⁾
Полиомиелит	x	x	x		x	x		
Дифтерия (круп)	x	x	x		x	x		x ⁽⁵⁾
Столбняк	x	x	x		x	x		x
Коклюш	x	x	x		x	x		x ⁽⁵⁾
Гемофильная инфекция В	x	x	x		x			
Гепатит В (желтуха)	x	x	x		x		xx ⁽³⁾	
Пневмококк 13 серотипов	x		x	x				
Ротавирус ⁽⁶⁾	x	x	x ⁽⁷⁾					
Корь				x			x ⁽²⁾	
Свинка				x			x ⁽²⁾	
Краснуха				x			x ⁽²⁾	
Менингококк типа С					x			
Вирус папилломы человека ⁽⁸⁾							xxx	

На что обратить особое внимание

- * По закону обязательной является лишь вакцинация от полиомиелита. Служба ребенка и семьи настоятельно рекомендует пройти полную схему, установленную Высшим советом здравоохранения Бельгии, см. выше).
- * Вы можете свободно выбирать, где проводить вакцинацию – в консультационном бюро Службы ребенка и семьи, у домашнего врача или у педиатра.

- (1) Первый год обучения
- (2) Пятый год обучения
- (3) Первый год среднего образования (только для тех, кто не был вакцинирован ранее от гепатита В)
- (4) Третий год среднего образования
- (5) Более низкая доза вакцины от дифтерии и коклюша для взрослых
- (6) Плата за вакцину частично возвращается и составляет, таким образом, 11 евро (для лиц с обычной страховкой). Вакцину можно приобретать только самому в аптеке по предписанию врача и хранить дома в холодном месте (от 2 до 8°C). Вакцину нельзя замораживать.
- (7) Две или три дозы, в зависимости от марки.
- (8) Вакцинация рекомендуется для когорты (возрастной группы) девочек и составляет 3 дозы