

OGÓLNY SCHEMAT SZCZEPIEŃ ZALECANYCH

Poolse vertaling uit het Nederlands van: 'Vaccinatieschema'

Oktober 2015

Szczepienie przeciw	8 tyg.	12 tyg.	16 tyg.	12 m.c.	13/15 m.c. ⁽¹⁾	5-7 lat ⁽²⁾	10-13 lat	14-16 lat ⁽³⁾
Polio								
Dyfteryt (błonica)								
Tęžec								
Krzusiec (koklusz)								
Haemophilus Influenzae typu b (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)								
WZW typu B (wirus zapalenia wątroby typu B)								
Pneumokok 13 serotypów								
Rotawirusy ⁽⁴⁾								
Odra								
Nagminne zapalenie przyusznic (świnka)								
Różyczka								
Meningokok typu C (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)								
Human Papilloma Virus ⁽⁵⁾ (wirus brodawczaka ludzkiego)								

Punkty szczególnej uwagi:

Z prawnego punktu widzenia obowiązkowe jest tylko szczepienie przeciw polio. Mogą Państwo poprosić o wykonanie tylko szczepienia przeciw polio.

Kind en Gezin (Dziecko i Rodzina) zdecydowanie zaleca zastosowanie całego schematu szczepień, przedstawionego przez Hoge Gezondheidsraad (belgijska Wysoka Rada ds. Zdrowia) (schemat: zob. wyżej).

Do przeprowadzenia szczepienia, masz wybór pomiędzy gabinetem konsultacyjnym Kind en Gezin, lekarzem rodzinnym, lub pediatrą.

- (1) Pierwsza klasa szkoły podstawowej.
- (2) Piąta klasa szkoły podstawowej.
- (3) Trzecia klasa szkoły średniej.
- (4) Koszt szczepionki jest częściowo refundowany i po refundacji wynosi 11,80 euro za dawkę (dla ubezpieczonych o zwykłym statusie). Szczepionkę, na receptę, należy wykupić w aptece i przechowywać w domu w chłodnej temperaturze (pomiędzy 2-8 °C). Szczepionki nie można zamrażać.
- (5) Dwie lub trzy dawki, w zależności od marki.
- (6) Pierwsza klasa szkoły średniej. Dwie dawki z przerwą 6 miesięcy (minimum 5 miesięcy).
- (7) Dodatkowa dawka przy ciąży trwającej krócej niż 37 tygodni lub przy wadze urodzeniowej niższej niż 2,500 kg.
- (8) W 13 miesiącu życia, zamiast 15. przy ciąży trwającej krócej niż 37 tygodni lub przy wadze urodzeniowej niższej niż 2,500 kg.