

جدول کلی واکسیناسیون‌های توصیه شده

Farsi vertaling uit het Nederlands van: 'Vaccinatieschema'

Oktober 2015

واکسیناسیون علیه	8 هفته	12 هفته	16 هفته	12 ماهگی	15 ماهگی	5-7 ساله ⁽¹⁾	10-13 ساله	14-16 ساله ⁽²⁾
فلج اطفال								
دیفتری								
کزاز								
سیاه سرفه								
مننژیت ب								
هیپاتیت ب (یرقان)								
پنو مو کوک								
روتا ⁽⁴⁾								
سرخک								
اریون								
سرخچه								
مننژیت C								
سرطان دهانه رحم ⁽⁵⁾								

نکات مورد توجه

از نظر قانونی فقط واکسن فلج اطفال اجباری است. شما میتوانید درخواست کنید که فقط این واکسن اجرا گردد.

اما **Kind en Gezin** توصیه می‌کند کل طرح پیشنهاد شده از جانب شورای عالی بهداشت بلژیک (طرح: به بالا مراجعه کنید) اجرا شود. برای اجرا واکسن میتوانید **Kind en Gezin**، پزشک خود و یا یک متخصص اطفال را انتخاب کنید.

(1) اولین سال مدرسه

(2) سال پنجم مدرسه

(3) سال سوم دبیرستان

(4) هزینه این واکسن تا قسمتی تامین شده و **11,80** یورو برای هر دوز می‌باشد برای افرادی که تحت پوشش بیمه استاندارد قرار دارند باید واکسن را با ارائه نسخه پزشک از داروخانه خریداری کنید و در منزل در محیطی خنک (بین 2 و 8 درجه) نگهداری کنید. واکسن نباید منجمد شود.

(5) دو تا سه دوز بر اساس نشان تجاری

(6) سال اول دبیرستان. دو دوز با فاصله شش ماه (حداقل پنج ماه)

(7) دوز اضافه در صورتی که دوره بارداری کمتر از 37 هفته بوده یا وزن هنگام تولد کمتر از 2,5 کیلوگرم باشد.

(8) در 13 ماهگی بجای 15 ماهگی در صورتی که دوره بارداری کمتر از 37 هفته بوده یا وزن هنگام تولد کمتر از 2,5 کیلوگرم باشد.