



SCREENING AUDITIV: COPILUL DVS. NU A TRECUT TESTUL DE AUZ ... CE URMEAZĂ?

Bebelușul dvs. a fost supus la un test al auzului. Acest screening auditiv a detectat faptul că una sau ambele urechi au o deficiență de auz.

Acest lucru vă sperie: evident, nu vă așteptați ca bebelușul dvs. să nu treacă testul de screening. De aceea dorim să vă oferim mai multe informații cu privire la ceea ce vă puteți aștepta să urmeze.

MODUL ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ TESTUL DE AUZ

Un test de screening nereușit este o indicație a unei pierderi potențiale a auzului.

Pentru a fi siguri, un al doilea test de control este efectuat în cazul în care primul test de auz a fost negativ. Testul de control este o repetare a primului test de screening al auzului. Unul din doi copii va avea un rezultat normal în timpul testului de control. Acest lucru nu este atât de surprinzător, deoarece o scădere temporară a auzului poate explica un rezultat negativ la primul test (o răceală, etc.).

În cazul în care există un al doilea rezultat negativ, bebelușul dvs. va fi îndrumat pentru testare suplimentară.

TRIMITERE DUPĂ TESTUL DE CONTROL

După consultarea cu dvs., asistenta regională vă va face o programare la un centru pentru diagnosticarea problemelor de auz a copiilor mici. Testarea suplimentară va avea loc cât mai curând posibil, în principiu într-o perioadă de 2 săptămâni. Se va testa dacă bebelușul dvs. are o problemă de auz și dacă da, cât de severă este aceasta.

Ca părinte, veți avea multe întrebări în această perioadă tensionată și îngrijorătoare. Puneți întrebările pe care le considerați importante și înarmați-vă cu informații. Asistenta medicală de la „Kind en Gezin” (Agenția pentru Protecția Copilului și Familiei) vă va informa cu privire la măsurile care trebuie luate și vă va ajuta să găsiți soluțiile cele mai

potrivite pentru dvs.

Bebelușul meu răspunde la sunete; este totuși necesar să se efectueze teste suplimentare?

Da, testarea suplimentară este necesară. Bebelușii care suferă de pierderea auzului pot reacționa la sunete sau vibrații de diferite înălțimi sau intensități; o reacție la sunet nu înseamnă că nu există o pierdere a auzului.

În cazul în care bebelușul dvs. suferă de pierderea auzului, este important să se descopere acest lucru cât mai repede posibil.

TRIMITERE:

Centrul la care se face trimiterea:

.....
.....
.....

Adresa:

.....
.....
.....

Programare:

.....
.....
.....

Informații suplimentare precum și broșura „Testul de auz este efectuat... ce urmează?” pot fi găsite pe site-ul web www.kindengezin.be la rubrica sănătate și vaccinări - continuare tratament - consult medical preventiv - test de auz.