

Ogólny schemat zalecanych szczepień

Szczepienia przeciwko	8 tygodni	12 tygodni	16 tygodni	12 miesięcy	15 miesięcy ⁽¹⁾	5-7 lat	10-13 lat ⁽⁴⁾	14-16 lat
Poliomyelitis								
Błonica								
Tężec								
Krztusiec								
Haemophilus Influenzae B (Zapalenie opon mózgowych)								
Żółtaczką (Hepatitis B)								
Pneumokoki ⁽¹⁾ 13 serotypów								
Rotawirus ⁽²⁾								
Odra								
Świnka								
Różyczka (Rubella)								
Meningokoki typ C lub ACWY ⁽³⁾ (Zapalenie opon mózgowych)								
Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) ⁽⁴⁾								

- bezpłatne
- płatne
- szczepionka skojarzona: 1 iniekcja

- (1) Jeśli ciąża trwa mniej niż 37 tygodni lub jeśli masa urodzeniowa jest niższa niż 2,5 kg:
 - Podaje się dodatkową dawkę przeciw pneumokokom w wieku 12 tygodni.
 - Podanie szczepionki przyspiesza się z wieku 15 miesięcy do wieku 13 miesięcy.
- (2) Szczepionka przeciwko rotawirusom wydawana na receptę lekarską kosztuje około 12 euro. Należy przechowywać ją w lodówce (2-8°C). Potrzebne są 2 lub 3 dawki, w zależności od marki.
- (3) Rada ds. Zdrowia zaleca szczepienie przeciwko meningokokom ACWY zamiast tylko przeciwko meningokokom C. Szczepionka ACWY wydawana na receptę lekarską kosztuje około 53 euro. Należy przechowywać ją w lodówce (2-8°C).
- (4) 1 rok nauki w szkole średniej. 2 dawki w odstępie 6 miesięcy.

Szczególne punkty uwagi:

Kind en Gezin zdecydowanie zaleca zastosowanie pełnego schematu szczepień, zaproponowanego przez Belgijską Radę ds. Zdrowia. Zgodnie z prawem, tylko szczepienia przeciwko polio są obowiązkowe.

Oprócz szczepionek schematu podstawowego, istnieją również inne szczepionki, które można podawać w celu indywidualnej ochrony dziecka, np. szczepionka przeciw meningokokom B, ospie wietrznej i wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Przy podawaniu szczepionki mogą Państwo swobodnie wybrać pomiędzy biurem konsultacji („Centrum Zdrowia Dziecka”) Kind en Gezin, lekarzem rodzinnym lub pediatrą.