

Обща схема на препоръчаните имунизации

Имунизация срещу	8 седмици	12 седмици	16 седмици	12 месеца	15 месеца ⁽¹⁾	5-7 години	10-13 години ⁽⁴⁾	14-16 години
Полиомиелит								
Дифтерит								
Тетанус								
Пертусис (коклюш)								
Хемофилус инфлуенца В (възпаление на оръчната кора)								
Хепатит В (жълтеница)								
Пневмококи ⁽¹⁾ 13-валентна								
Ротавирус ⁽²⁾								
Морбили								
Паротит								
Рубеола								
Менингококи тип С или ACWY ⁽³⁾ (възпаление на мозъчната ора)								
Човешки папиломен вирус ⁽⁴⁾								

- безплатна
- не е безплатна
- комбинирана ваксина: 1 спринцовка

- (1) При продължителност на бременността под 37 седмици и тегло на новороденото под 2,5 kg:
 - на възраст 12 седмици се дава допълнителна доза срещу пневмококи.
 - ваксините за 15 месеца се дават на 13 месеца.
- (2) Ротавирусната ваксина струва около 12 евро, с рецепта от лекар. Съхранява се в хладилник (2-8°C). Необходими са 2 или 3 дози, в зависимост от марката.
- (3) Висшият здравен съвет препоръчва имунизация срещу менингококи ACWY вместо само срещу менингококи С. Ваксината ACWY струва около 53 евро, с рецепта от лекар. Съхранява се в хладилник (2-8°C).
- (4) 1-ва година от средното образование. 2 дози в интервал от 6 месеца.

Специални аспекти:

„Дете и семейство“ (Kind en Gezin) силно препоръчва прилагане на тази пълна схема, предложена от Висшия здравен съвет на Белгия.

По закон само полиоваксината е задължителна.

Освен ваксините от тази основна схема има и други ваксини, които можете да дадете за индивидуална защита на детето си, напр. срещу менингококи В, дребна шарка и хепатит А.

Консултирайте се за това с лекуващия лекар.

За поставянето на ваксината можете свободно да изберете между детската консултация на „Дете и семейство“ (Kind en Gezin), личния лекар или педиатър.