

Allgemeiner Plan der empfohlenen Impfungen

Impfung gegen	8 Wochen	12 Wochen	16 Wochen	12 Monate	15 Monate ⁽¹⁾	5-7 Jahre	10-13 Jahre ⁽⁴⁾	14-16 Jahre
Poliomyelitis								
Diphtherie (Krupp)								
Tetanus (Wundstarrkrampf)								
Pertussis (Keuchhusten)								
Haemophilus-influenzae-b (Hirnhautentzündung)								
Hepatitis B (Gelbsucht)								
Pneumokokken ⁽¹⁾ PVC13								
Rotavirus ⁽²⁾								
Masern								
Mumps (Ziegenpeter)								
Röteln (Rubella)								
Meningokokken Typ C oder ACWY ⁽³⁾ (Hirnhautentzündung)								
Humane Papillomaviren ⁽⁴⁾								

- kostenlos
- nicht kostenlos
- Kombinationsimpfung: 1 Spritze

- (1) Bei einer Schwangerschaftsdauer von weniger als 37 Wochen oder einem Geburtsgewicht unter 2,5 kg:
 - wird eine zusätzliche Dosis gegen Pneumokokken im Alter von 12 Wochen verabreicht;
 - werden die Impfungen im Alter von 15 Monaten auf 13 Monate vorverlegt.
- (2) Der Rotavirus-Impfstoff kostet ca. € 12 auf ärztliche Verordnung. Im Kühlschrank aufbewahren (2 bis 8 °C). Abhängig von der Marke sind 2 oder 3 Verabreichungen erforderlich.
- (3) Der Hohe Gesundheitsrat empfiehlt eine Impfung gegen Meningokokken ACWY statt nur gegen Meningokokken C. Der ACWY-Konjugatimpfstoff kostet ca. € 53 auf ärztliche Verordnung. Im Kühlschrank aufbewahren (2 bis 8 °C).
- (4) 1. Jahr des Sekundarunterrichts. 2 Verabreichungen mit einem Intervall von 6 Monaten.

Besondere Schwerpunkte

„Kind en Gezin“ empfiehlt ausdrücklich die Anwendung des vollständigen Impfplans, der vom Hohen Gesundheitsrat von Belgien vorgeschlagen wird. Laut Gesetz ist nur die Polio-Impfung obligatorisch.

Außer den Impfungen dieser Grundimmunisierung gibt es noch andere Impfstoffe für den individuellen Schutz Ihres Kindes, beispielsweise gegen Meningokokken B, Windpocken und Hepatitis A. Erkundigen Sie sich hierfür bei Ihrem Arzt.

Für die Verabreichung eines Impfstoffs haben Sie die freie Wahl zwischen dem Konsultationsbüro von „Kind en Gezin“ sowie Ihrem Haus- oder Kinderarzt.