

Schéma général des vaccins recommandés

Septembre 2019

Vaccination contre	8 semaines	12 semaines	16 semaines	12 mois	15 mois ⁽¹⁾	5-7 ans	10-13 ans ⁽⁴⁾	14-16 ans
Poliomyélite								
Diphtérie (croup)								
Tétanos (trismus)								
Pertussis (coqueluche)								
Haemophilus Influenzae de type B (méningite)								
Hépatite B (jaunisse)								
Pneumocoques ⁽¹⁾ Sérotypes-13								
Rotavirus ⁽²⁾								
Rougeole								
Oreillons								
Rubéole								
Méningocoques de type C ou ACWY ⁽³⁾ (méningite)								
Papillomavirus humain ⁽⁴⁾								

- gratuit
- non gratuit
- vaccin combiné 1 injection

- (1) En cas de grossesse de moins de 37 semaines ou d'un poids à la naissance de moins de 2,5 kg :
 - une dose supplémentaire contre les pneumocoques est administrée à l'âge de 12 semaines ;
 - les vaccins des 15 mois sont ramenés à 13 mois.
- (2) Le vaccin anti-rotavirus coûte environ 12 euros sur ordonnance. À conserver au réfrigérateur (2-8° C). Deux à 3 doses sont nécessaires, en fonction de la marque.
- (3) Le Conseil Supérieur de la Santé recommande la vaccination contre les méningocoques ACWY, plutôt que celle uniquement contre les méningocoques C. Le vaccin ACWY coûte environ 53 euros sur ordonnance. À conserver au réfrigérateur (2-8° C).
- (4) Première année de l'enseignement secondaire. 2 doses avec un intervalle de 6 mois

Considérations spéciales :

Kind en Gezin recommande vivement de suivre le schéma complet, tel que proposé par le Conseil Supérieur de la Santé de Belgique.

Du point de vue légal, seule la vaccination contre la polio est obligatoire.

Outre les vaccins figurant dans ce schéma de base, il existe également d'autres vaccins que vous pouvez administrer dans le cadre de la protection individuelle de votre enfant, par exemple contre les méningocoques B, la varicelle et l'hépatite A.

Adressez-vous à votre médecin traitant pour tout complément d'information.

Pour l'administration d'un vaccin, vous avez le choix entre le bureau de consultation de Kind en Gezin, votre médecin généraliste et un pédiatre.