

General timetable for the recommended vaccinations

Vaccin împotriva	8 săptămâni	12 săptămâni	16 săptămâni	12 luni	15 luni ⁽¹⁾	5-7 ani	10-13 ani ⁽⁴⁾	14-16 ani
Poliomielită								
Difterie (crupă)								
Tetanos								
Pertussis (tuse convulsivă)								
Haemophilus Influenzae B (meningită)								
Hepatita B (icter)								
Pneumococi ⁽¹⁾ 13 serotipuri								
Rotavirus ⁽²⁾								
Pojar								
Oreion								
Rubeolă								
Meningococi tip C sau ACWY ⁽³⁾ (meningită)								
Virusul papilomavirus uman (HPV) ⁽⁴⁾								

- gratuit
- contra cost
- vaccin combinat: 1 administrare

- (1) În cazul unei durate a sarcinii de mai puțin de 37 de săptămâni sau a unei greutate la naștere mai mică de 2,5 kg:
 - Se administrează o doză suplimentară împotriva pneumococilor la vârsta de 12 săptămâni.
 - Vaccinurile de la vârsta de 15 luni se administrează anticipat la vârsta de 13 luni.
- (2) Vaccinul împotriva rotavirusului costă aproximativ € 12, cu rețetă emisă de medic. A se păstra în frigider (2-8°C). Sunt necesare 2 sau 3 doze, în funcție de producător.
- (3) Consiliul Sănătății recomandă vaccinarea împotriva meningococilor ACWY și nu doar a meningococului C. Vaccinul ACWY costă aproximativ € 53, cu rețetă emisă de medic. A se păstra în frigider (2-8°C).
- (4) Primul an de ciclu secundar. 2 doze la interval de 6 luni.

Aspecte importante:

Kind en Gezin recomandă administrarea întregii scheme propuse de Consiliul Sănătății din Belgia.

Doar vaccinul anti-poliomielită este obligatoriu prin lege.

Pe lângă vaccinurile din această schemă de bază, mai sunt și alte vaccinuri pe care le puteți administra pentru protecția individuală a copilului dvs., de exemplu împotriva meningococului B, a varicelei și a hepatitei A.

Consultați în acest scop medicul dvs. de familie.

Pentru administrarea vaccinurilor puteți alege între serviciile Kind en Gezin, cele ale medicului dvs. de familie sau cele ale pediatrului.