

Общая схема рекомендуемых прививок

Вакцинация против:	8 неделя	12 неделя	16 неделя	12 месяцев	15 месяцев ⁽¹⁾	5-7 лет	10-13 лет ⁽⁴⁾	14-16 лет
Полиомиелит								
Дифтерия								
Столбняк								
Коклюш								
Гемофильная палочка типа b (менингит)								
Гепатит В (желтуха)								
Пневмококки ⁽¹⁾ 13 серотипов								
Ротавирус ⁽²⁾								
Корь								
Паротит (свинка)								
Краснуха								
Менингококки типов С или ACWY ⁽³⁾ (менингит)								
Вирус папилломы человека ⁽⁴⁾								

- бесплатно
- платно
- комбинированная вакцина: 1 укол

- (1) При длительности беременности менее 37 недель или весе при рождении менее 2,5 кг :
 - Вводится дополнительная доза вакцины против пневмококков в возрасте 12 недель.
 - Введение вакцин с 15 месяцев переносится на возраст 13 месяцев.
- (2) Вакцина от ротавируса стоит около 12 евро по рецепту врача. Ее необходимо хранить в холодильнике (2-8°C). Нужно 2 или 3 дозы в зависимости от марки вакцины.
- (3) Высший совет здравоохранения рекомендует вакцинацию против менингококков ACWY вместо вакцинации против менингококка С. Вакцина ACWY стоит около 53 евро по рецепту врача. Ее необходимо хранить в холодильнике (2-8°C).
- (4) Первый класс средней школы. 2 дозы с промежутком в 6 месяцев.

Пункты особого внимания:

«Ребенок и семья» настоятельно рекомендует полностью следовать этой схеме, предложенной Высшим советом здравоохранения Бельгии. По закону обязательна только вакцинация от полиомиелита. Кроме прививок из этой базовой схемы существуют также и другие прививки, которые вы можете сделать ребенку для его защиты, например, от менингококка В, ветряной оспы и гепатита А.

Посоветуйтесь с наблюдающим его врачом. Для проведения вакцинации вы можете свободно выбирать между консультацией «Ребенок и семья», вашим домашним врачом или педиатром.