

Všeobecný harmonogram odporúčaných očkovaní

Vakcinácia v	8-ich týždňoch	12-ich týždňoch	16-ich týždňoch	12-ich mesiacoch	15-ich mesiacoch ⁽¹⁾	5-7-ich rokoch	10-13-ich rokoch ⁽⁴⁾	14-16-ich rokoch
Detská obrna								
Záškrt (diftéria)								
Tetanus (strnulosť šije)								
Pertussis (čierny kašeľ)								
Haemophilus Influenzae B (meningitída), Hepatitída B (žltáčka)								
Pneumokoky ⁽¹⁾ 13 sérotypov								
Rotavírus ⁽²⁾								
Osýpky								
Prúšnice (zápal príušných žliaz)								
German measles (rubella)								
Meningokoky typu C alebo ACWY ⁽³⁾ (meningitída)								
Ľudský papilomavírus ⁽⁴⁾ Všeobecný harmonogram								

- zdarma
- nie zdarma
- kombinovaná vakcína: 1 injekcia

- (1) S gestačným vekom menej ako 37 týždňov alebo s pôrodnou hmotnosťou menej ako 2,5 kg:
 - Sa podáva extra dávka proti pneumokokom vo veku 12 týždňov.
 - Vakcíny podávané v 15 mesiacoch sú posunuté na podávanie v 13 mesiacoch.
- (2) Rotavírusová vakcína stojí na lekársky predpis okolo 12 €. Uchovávať v chladničke pri teplote (2 - 8°C). V závislosti od značky sú potrebné 2 alebo 3 dávky.
- (3) Vysoká zdravotnícka rada odporúča vakcináciu proti ACWY-meningokokom namiesto vakcinácie len proti meningokokom C. ACWY-vakcína stojí na predpis približne 53 €. Uchovávať v chladničke pri teplote (2-8°C).
- (4) 1. ročník stredoškolského vzdelávania. 2 dávky s intervalom 6 mesiacov.

Body osobitnej pozornosti:

Dieťa a Rodina (poradenské stredisko pre deti v Belgicku-poznámka prekladateľa) dôrazne odporúča uplatňovanie tohto kompletného systému, ktorý navrhla Vysoká zdravotnícka rada Belgicka.

Z právneho hľadiska je povinná iba vakcína proti detskej obrne.

Okrem vakcín z tohto základného harmonogramu existujú aj ďalšie vakcíny, ktoré môžete podať

pre individuálnu ochranu vášho dieťaťa, napr. proti meningokokom B, proti ovčím kiahňam a hepatitíde A.

Poradte sa so svojim ošetrojúcim lekárom.

Pri podávaní vakcíny máte na výber medzi poradenským strediskom pre deti, vaším obvodným lekárom alebo detským lekárom.