

Skema e përgjithshme e vaksinimit të rekomanduar

Vaksinim kundër	8 javë	12 javë	16 javë	12 -muajsh	15 -muajsh ⁽¹⁾	5-7 vjeç	10-13 vjeç ⁽⁴⁾	14-16 vjeç
Poliomielit	[Falas]				[Falas]			
Difteri (grykët e bardha)	[Falas]				[Falas]	[Falas]		[Falas]
Tetanos	[Falas]				[Falas]	[Falas]		[Falas]
Pertussis (kollë e mirë)	[Falas]				[Falas]	[Falas]		[Falas]
Haemophilus influenzae tip B (inflamacion i cipës së trurit)	[Falas]				[Falas]			
Hepatit B (verdhëza)	[Falas]				[Falas]			
Pneumokokët ⁽¹⁾ 13-serotipa	[Falas]	[Falas] ⁽¹⁾	[Falas]	[Falas]				
Rotavirusi ⁽²⁾	[Kundrejt pagesës]	[Kundrejt pagesës]	[Kundrejt pagesës]					
Fruth				[Falas]			[Falas]	
Parotit (shytat)				[Falas]			[Falas]	
Rubeolë				[Falas]			[Falas]	
Meningokokët e tipit C ose ACWY ⁽³⁾ (inflamacion i cipës së trurit)					[Falas]	[Kundrejt pagesës]		
Virusi i papilomës njerëzore ⁽⁴⁾							[Falas]	[Falas]

- falas
- kundrejt pagesës
- vakcina e kombinuar: 1 injeksion

- (1) Me moshë gestacionale më pak se 37 javë ose me peshë lindjeje më të vogël se 2,5 kg:
 - Jepet një dozë shtesë kundër pneumokokëve në moshën 12-javëshe.
 - Vaksinat e moshës 15-muajshe bëhen në moshën më të hershme 13-muajshe.
- (2) Vakcina e rotavirusit kushton afërsisht 12 € dhe jepet me përshkrim të mjekut. Të ruhet në frigorifer në temperaturën (2-8°C) Në varësi të markës, janë të nevojshme 2 ose 3 doza.
- (3) Këshilli i Lartë për Shëndetin rekomandon vaksinimin kundër meningokokëve ASWY, në vend të vaksinës kundër meningokokut të tipit C. Vakcina ACWY kushton afërsisht 53 €. Të ruhet në frigorifer në temperaturën (2-8°C)
- (4) Viti i parë i arsimit të mesëm të ulët. 2 doza në një interval prej 6 muajsh.

Pika të veçanta në vëmendje:

Agjencia 'Fëmija dhe Familja' rekomandon fuqimisht zbatimin e kësaj skeme të plotë, të propozuar nga Këshilli i Lartë për Shëndetin në Belgjikë. E detyrueshme me ligj është vetëm kryerja e vaksinës së poliomielitit. Përveç vaksinave të skemës bazë, ekzistojnë edhe vakcina të tjera që bëhen me qëllim të mbrojtjes së fëmijës tuaj nga meningokoku i tipit B, variçela dhe hepatiti A. Këshillohuni për këtë me mjekun tuaj. Për bërjen e vaksinës keni mundësinë e zgjedhjes së lirë midis qendrës konsultore 'Fëmija dhe Familja, mjekut të familjes ose pediatrit.