






















































Önerilen aşuların genel cetveli

... karşı aşılama	8 haftalık	12 haftalık	16 haftalık	12 aylık	15 aylık ⁽¹⁾	5-7 yaşında	10-13 yaşında ⁽⁴⁾	14-16 yaşında
Poliomyelit								
Difteri (kuş palazı)								
Tetanoz (kazıklı humma)								
Pertusis (boğmaca)								
Haemophilus Influenzae B (beyin zarı iltihabı)								
Hepatit B (sarılık)								
Pnömonokt ⁽¹⁾ 13 serotip								
Rotavirüs ⁽²⁾								
Kızamık								
Kabakulak hastalığı (kabakulak)								
Kızamıkçık (rubella)								
Meningokok tip C veya ACWY ⁽³⁾ (beyin zarı iltihabı)								
İnsan papillom virüsü ⁽⁴⁾								

-  ücretsiz
-  ücretsiz değil
-  kombine aşı: 1 enjeksiyon

- (1) 37 haftadan az süren gebelik dönemi durumunda veya 2,5 kilonun altında bulunan doğum ağırlığı halinde:
 - 12 haftalıkken pnömokoklara karşı ekstra bir dozaj verilmektedir.
 - 15 aylıkken yapılan aşular 13 aylık yapılmak üzere öne alınmaktadır.
- (2) Rotavirüs aşısının ücreti doktor reçetesiyle yaklaşık 12 €'dur. Buzdolabında muhafaza edilmelidir (2-8°C). Markasına göre 2 veya 3 dozaj gerekir.
- (3) Yüksek Sağlık Kurulu sadece meningokok C'ye karşı aşının yerine meningokok ACWY'ye karşı aşığı önermektedir. ACWY aşısı doktor reçetesiyle yaklaşık 53 €'dur. Buzdolabında muhafaza edilmelidir (2-8°C).
- (4) Ortaokulun birinci sınıfı. 6 aylık arayla 2 dozaj.

Özel odak noktaları:

Kind en Gezin (Çocuk ve Aile), Belçika Yüksek Sağlık Kurulunca önerilen bu cetvelin tamamını uygulamanızı önemle tavsiye etmektedir.

Kanunen sadece polio aşısı zorunludur.

Çocuğunuzun bireysel olarak korunması için temel cetveldeki aşuların yanı sıra yaptırabileceğiniz başka aşular da bulunmaktadır, örn. meningokok B, su çiçeği ve hepatit A'ya karşı.

Bunun için tedavi gördüğünüz hekiminize danışın.

Aşının yapılması için Kind en Gezin'in sağlık merkezi, aile hekiminiz veya çocuk sağlığı uzmanı arasında serbest seçme hakkınız var.