

Прививка против	8 недель	12 недель	16 недель	12 месяцев	13/15 месяцев <sup>(8)</sup>	5-7 лет <sup>(1)</sup>	10-13 лет	14-16 лет <sup>(3)</sup>
Полиомиелит								
Дифтерия (круп)								
Столбняк								
Коклюш								
Гемофильная инфекция Б								
Гепатит Б (желтуха)								
Пневмококк		<sup>(7)</sup>						
Ротавирус <sup>(4)</sup>		<sup>(5)</sup>	<sup>(5)</sup>					
Корь							<sup>(2)</sup>	
Свинка								
Краснуха								
Менингококк типа С								
Вирус папилломы человека <sup>(6)</sup>								

### На что обратить особое внимание

- \* По закону обязательной является лишь вакцинация от полиомиелита. Вы можете попросить сделать прививку только от полиомиелита. Служба ребенка и семьи настоятельно рекомендует пройти полную схему, установленную Высшим советом здравоохранения Бельгии, см. выше).
- \* Вы можете свободно выбирать, где проводить вакцинацию – в консультационном бюро Службы ребенка и семьи, у домашнего врача или у педиатра.

- (1) Первый год обучения
- (2) Пятый год обучения
- (3) Третий год среднего образования
- (4) Плата за вакцину частично возвращается и составляет, таким образом, 11,80 евро (для лиц с обычной страховкой). Вакцину можно приобретать только самому в аптеке по предписанию врача и хранить дома в холодном месте (от 2 до 8°C). Вакцину нельзя замораживать.
- (5) Две или три дозы, в зависимости от марки.
- (6) 1-й год среднего образования. 2 дозы с интервалом в 6 месяцев (минимальный интервал – 5 месяцев).
- (7) Дополнительная доза в случае, если беременность длилась менее 37 недель или вес при рождении составлял менее 2500 г.
- (8) В 13 месяцев вместо 15 месяцев, если беременность длилась менее 37 недель или вес при рождении составлял менее 2500 г.