

## Имунизации

Тази таблица съдържа болестите, за които се препоръчва имунизация по основната вакцинационна схема. Усложненията при тези болести се сравняват с усложненията при имунизация, като се извеждат възможни странични действия на ваксините. Като пациент за странични действия на лекарства, вкл. ваксини, можете да съобщите във Федералната агенция по лекарствата и здравните продукти на адрес fagg.be.

Болест	Сериозни усложнения		Странично действие на ваксината
	При заболяване	При ваксиниране	
<p>Дифтерит</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сериозно възпаление на гърлото с опасност от задушаване.</li> <li>• Бактерията отделя токсин, който поражда (парализира) нервите и може да доведе до възпаление на сърдечния мускул и смърт.</li> </ul>	<p>Възпаление на сърдечния мускул: 5/10 Парализа: 4-10/100 Смъртност: 20 % (при &lt; 5-годишни) 5-10 % (5-40 г.)</p>	-	<p>Комбинирана шесторна ваксина • 10 % локално подуване, зачервяване, болка или висока температура. • При повторна доза в по-напреднала възраст: понякога отичане на крайниците. Минава напълно след няколко дни.</p>
<p>Тетанус</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Причинява се от бактерия, която вирее в почвата и уличната мръсотия.</li> <li>• Причинява мускулни спазми. Може да протече сериозно с парализа на дихателните мускули и в следствие смърт.</li> </ul>	<p>Смъртност: 10-80%</p>	-	<p>Комбинирана шесторна ваксина • 10 % локално подуване, зачервяване, болка или висока температура. • При повторна доза в по-напреднала възраст: понякога отичане на крайниците. Минава напълно след няколко дни.</p>
<p>Коклюш</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Инфекция на дихателните пътища с бактерия, която произвежда токсини.</li> <li>• Изтощителни пристъпи на кашлица, които могат да доведат до увреждане на мозъка поради недостиг на въздух.</li> </ul>	<p>Бебета под 1 година: Временно спиране на дишането: 60 % Възпаление на белия дроб: 10 % Спазми: 1-3 % Мозъчно увреждане: 1-3 ‰ Трайна вреда: ‰ Смъртност: 1%</p>	-	<p>Комбинирана шесторна ваксина • 10 % локално подуване, зачервяване, болка или висока температура. • При повторна доза в по-напреднала възраст: понякога отичане на крайниците. Минава напълно след няколко дни.</p>

Болест	Сериозни усложнения		Странично действие на ваксината
	При заболяване	При ваксиниране	
<p>Полио (детски паралич)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Парализиране настъпва при 1 от 100/200 заразени.</li> <li>• С изключение на някои страни болестта е премахната почти в целия свят след ваксинирането.</li> </ul>	<p>0,1-1 % парализа Смъртност: 10-30 % при парализа</p>	-	<p>Комбинирана шесторна ваксина</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 % локално подуване, зачервяване, болка или висока температура.</li> <li>• При повторна доза в по-напреднала възраст: понякога отичане на крайниците. Минава напълно след няколко дни.</li> </ul>
<p>Хепатит В</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Остро или хронично възпаление на черния дроб.</li> <li>• Риск от развиване на хронична инфекция: &lt; 1 г.: 15-95 % 1-5 г.: 20-50 % &gt; 5 г.: 5-10 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 от 4 хронични носители развива цироза или рак на черния дроб</li> </ul>	-	<p>Комбинирана шесторна ваксина</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 % локално подуване, зачервяване, болка или висока температура.</li> <li>• При повторна доза в по-напреднала възраст: понякога отичане на крайниците. Минава напълно след няколко дни.</li> </ul>
<p>Хемофилус инфлуенца тип b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Причинител на бактериално възпаление на мозъчната кора, общо отравяне на кръвта и др. Предимно деца на възраст до 4 години са изложени на риск.</li> </ul>	<p>Увреждания на нервната система: 15 %-30 % Глухота: 15 % Смъртност: 5 %</p>	- -	<p>Комбинирана шесторна ваксина</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 % локално подуване, зачервяване, болка или висока температура.</li> <li>• При повторна доза в по-напреднала възраст: понякога отичане на крайниците. Минава напълно след няколко дни.</li> </ul>

Болест	Сериозни усложнения		Странично действие на ваксината
	При заболяване	При ваксиниране	
<p>Пневмококова инфекция</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пневмококът е бактерия, от която има различни видове.</li> <li>• Важна причина за бактериално възпаление на мозъчната кора и средното ухо.</li> </ul>	<p>Общо отравяне на кръвта, възпаление на мозъчната кора, възпаление на белия дроб.</p> <p>Смъртност: 30% при възпаление на мозъчната кора</p>		<p>Използваната пневмококова ваксина не защитава от всички, а от тези видове пневмококи, които причиняват сериозни болести и се срещат често.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/5 локално подуване, зачервяване, болка или висока температура</li> <li>• Сериозните странични действия са рядкост.</li> </ul>
<p>Ротавирус</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Инфекция, която при малки деца често предизвиква диария, повръщане и висока температура.</li> <li>• Понякога е необходим прием в болница в следствие на обезводняване.</li> </ul>	<p>Обезводняване</p> <p>Смъртност: В западните страни: много ниска</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 % диария, повръщане</li> </ul>
<p>Рубеола</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обикновено не е нищо сериозно за децата, но инфекция по време на бременност може да причини малформации или вродени аномалии.</li> </ul>	<p>Недостиг на тромбоцити: 1/3000</p> <p>Мозъчно възпаление: 1/6000 9/10 от бебетата, инфектирани в 1-вото тримесечие от бременността, имат вродени аномалии (глухота, слепота, сърдечни пороци)</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/10: общо неразположение и висока температура, евентуално с кожен обрив</li> <li>• До 1/100: възпаление на слюнчената жлеза</li> <li>• 5/100: подути жлези</li> <li>• 1/20000-30000: недостиг на тромбоцити</li> <li>• 0-3/100 ставни реакции при деца</li> </ul>

Болест	Сериозни усложнения		Странично действие на ваксината
	При заболяване	При ваксиниране	
<p>Морбили</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Силно заразна болест с висока температура и червени петна по кожата.</li> <li>• 1 от 5 (20 %) имат усложнения</li> </ul>	<p>Възпаление на белия дроб: 3,87,3 % Спазми: 0,3-0,5 % Мозъчно възпаление: 0,5-1 ‰</p> <p>Хронично прогресивно мозъчно възпаление: 0,5-2/100000</p> <p>Смъртност: 1-2,5/10 000</p>	<p>-</p> <p>0,02-190/100000 1/1 млн.</p> <p>1/1 млн.</p>	<p>Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/10 общо неразположение и висока температура, евентуално с кожен обрив</li> <li>• До 1/100 възпаление на слюнчената жлеза</li> <li>• 5/100 подути жлези</li> <li>• 1/20000-30000 недостиг на тромбоцити</li> <li>• 0-3/100 ставни реакции при деца</li> </ul>
<p>Паротит</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вирусна инфекция, която прилича на настинка.</li> <li>• Характерни са подути подушни слюнчени жлези.</li> </ul>	<p>Мозъчно възпаление: &lt; 1 % Възпаление на тестисите: 20 % (при мъже след пубертета)</p> <p>Смъртност: 1/10000</p>	<p>1/1 млн.</p> <p>-</p>	<p>Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/10: общо неразположение и висока температура, евентуално с кожен обрив</li> <li>• До 1/100: възпаление на слюнчената жлеза</li> <li>• 5/100: подути жлези</li> <li>• 1/20000-30000: недостиг на тромбоцити</li> <li>• 0-3/100 ставни реакции при деца</li> </ul>
<p>Менингококова инфекция</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сериозна бактериална болест, която може да се прояви като възпаление на мозъчната кора, мозъчно възпаление или общо отравяне на кръвта.</li> </ul>	<p>Трайни вреди: 30 % (глухота, двигателни проблеми и проблеми с ученето и поведението)</p> <p>Смъртност: 20%</p>	<p>-</p>	<p>Ваксина срещу менингококи С</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/10: локално подуване, зачервяване, болка или висока температура. Намален апетит</li> </ul>