

## Vacunas

Esta tabla ofrece información sobre las enfermedades para las que se aconseja vacunar en el esquema de vacunación básico. Las complicaciones de dichas enfermedades se comparan con las propias de las vacunaciones y con los posibles efectos secundarios de las mismas. Puedes comunicar en calidad de paciente cualquier efecto secundario de medicamentos y vacunas en la Agencia Federal de Medicamentos y Productos para la salud en fagg.be.

Enfermedad	Complicaciones graves		Efectos secundarios de la vacuna
	Por la enfermedad	Por la vacuna	
<p>Difteria (crup)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inflamación grave de la garganta con peligro de asfixia.</li> <li>• La bacteria libera una toxina que afecta a los nervios (parálisis) y puede provocar miocarditis y la muerte.</li> </ul>	<p>Miocarditis: 5/10 Parálisis: 4-10/100 Índice de mortalidad: 20 % (menores de 5 años) 5-10 % (5-40 años)</p>	-	<p>Vacuna combinada en seis dosis • 10 % inflamación local, enrojecimiento, dolor o fiebre. • Con la dosis de recuerdo en personas de más edad: a veces, inflamación de la extremidad. Esto remite por sí solo después de unos días.</p>
<p>Tétanos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se contrae a través de bacterias que viven en el suelo y los desperdicios.</li> <li>• Provoca espasmos musculares. Puede tener consecuencias fatales, pudiendo provocar la muerte por parálisis de los músculos respiratorios.</li> </ul>	<p>Índice de mortalidad: 10-80 %</p>	-	<p>Vacuna combinada en seis dosis • 10 % inflamación local, enrojecimiento, dolor o fiebre. • Con la dosis de recuerdo en personas de más edad: a veces, inflamación de la extremidad. Esto remite por sí solo después de unos días.</p>
<p>Tos ferina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infección de las vías respiratorias por la bacteria productora de toxinas.</li> <li>• Ataques de tos extenuantes que pueden provocar daños cerebrales a causa de la disnea.</li> </ul>	<p>Bebés menores de 1 año: Paro respiratorio temporal: 60 % neumonía: 10 % Convulsiones: 1-3 % Daños cerebrales: 1-3 ‰ Lesiones permanentes: 5 ‰ Índice de mortalidad: 1%</p>	-	<p>Vacuna combinada en seis dosis • 10 % inflamación local, enrojecimiento, dolor o fiebre. • Con la dosis de recuerdo en personas de más edad: a veces, inflamación de la extremidad. Esto se cura por sí solo después de unos días.</p>

Enfermedad	Complicaciones graves		Efectos secundarios de la vacuna
	Por la enfermedad	Por la vacuna	
<p>Poliomielitis (parálisis infantil)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La parálisis se da en 1 de cada 100/200 de las personas contagiadas.</li> <li>• Extinguida en gran número de países y casi en todo el mundo gracias a la vacunación.</li> </ul>	<p>0,1-1 % parálisis Índice de mortalidad: 10-30 % en caso de parálisis</p>	-	<p>Vacuna combinada en seis dosis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 % inflamación local, enrojecimiento, dolor o fiebre.</li> <li>• Con la dosis de recuerdo en personas de más edad: a veces, inflamación de la extremidad. Esto remite por sí solo después de unos días.</li> </ul>
<p>Hepatitis B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hepatitis aguda o crónica.</li> <li>• Riesgo de desarrollar una infección crónica: Menores de 1 año: 15-95 % 1-5 años : 20-50 % mayores de 5 años: 5-10 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 de cada 4 portadores crónicos desarrolla cirrosis o cáncer hepático</li> </ul>	-	<p>Vacuna combinada en seis dosis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 % inflamación local, enrojecimiento, dolor o fiebre.</li> <li>• Con la dosis de recuerdo en personas de más edad: a veces, inflamación de la extremidad. Esto remite por sí solo después de unos días.</li> </ul>
<p>Haemophilus Influenzae tipo b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Causante de, entre otros, meningitis bacteriana y septicemia generalizada. Sobre todo corren riesgo los niños menores de 4 años.</li> </ul>	<p>Lesiones en el sistema nervioso: 15 %-30 % Sordera: 15 % Índice de mortalidad: 5 %</p>	- -	<p>Vacuna combinada en seis dosis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 % inflamación local, enrojecimiento, dolor o fiebre.</li> <li>• Con la dosis de recuerdo en personas de más edad: a veces, inflamación de la extremidad. Esto remite por sí solo después de unos días.</li> </ul>

Enfermedad	Complicaciones graves		Efectos secundarios de la vacuna
	Por la enfermedad	Por la vacuna	
<p>Infecciones por neumococo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El neumococo es una bacteria de la que existen varios tipos.</li> <li>• Es la causa más común de meningitis bacteriana y otitis media.</li> </ul>	<p>Septicemia generalizada, meningitis, neumonía.</p> <p>Índice de mortalidad: 30 % en caso de meningitis</p>		<p>La vacuna que se utiliza contra el neumococo no protege contra todos los tipos de neumococos, pero sí contra los que provocan las enfermedades más graves y los más comunes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/5 inflamación localizada, enrojecimiento o fiebre.</li> <li>• Los efectos secundarios graves se producen en contadas ocasiones.</li> </ul>
<p>Rotavirus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infección que provoca comúnmente diarrea, vómitos y fiebre en niños pequeños.</li> <li>• A veces, es necesario el ingreso hospitalario a causa de la deshidratación.</li> </ul>	<p>Deshidratación</p> <p>Índice de mortalidad: En países occidentales: muy bajo</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 % diarrea, vómitos</li> </ul>
<p>Rubeola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalmente no es peligrosa en niños, pero si se contrae durante el embarazo puede provocar un aborto o anomalías congénitas.</li> </ul>	<p>Disminución del número de plaquetas:</p> <p>1/3000 Encefalitis:</p> <p>1/6000 9/10 bebés infectados durante el primer trimestre del embarazo nace con anomalías congénitas (sordera, ceguera, problemas cardíacos)</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubeola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/10: malestar general con fiebre y en ocasiones sarpullido</li> <li>• Hasta 1/100: infección de las glándulas salivales</li> <li>• 5/100: inflamación de los ganglios</li> <li>• 1/20000-30000: disminución de plaquetas</li> <li>• 0-3/100 reacciones en las articulaciones en niños</li> </ul>

Enfermedad	Complicaciones graves		Efectos secundarios de la vacuna
	Por la enfermedad	Por la vacuna	
<p>Sarampión</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enfermedad muy contagiosa con fiebre alta y sarpullido rojizo en la piel.</li> <li>• 1 de cada 5 (20 %) presenta complicaciones</li> </ul>	<p>Neumonía: 3,8-7,3 %                      Convulsiones: 0,3-0,5 %                      Encefalitis: 0,5-1 ‰                      Encefalitis crónica progresiva: 0,5-2/100000                      Índice de mortalidad: 1-2,5/10.000</p>	<p>-</p> <p>0,02-190/100000 1/1 millón</p> <p>1/1 millón</p>	<p>Vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubeola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/10 malestar general con fiebre y en ocasiones sarpullido</li> <li>• Hasta 1/100: infección de las glándulas salivares</li> <li>• 5/100 inflamación de los ganglios</li> <li>• 1/20000-30000 disminución de plaquetas</li> <li>• 0-3/100 reacciones en las articulaciones en niños</li> </ul>
<p>Parotiditis (paperas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infección viral semejante a un resfriado.</li> <li>• Son especialmente característicos los ganglios auriculares inflamados.</li> </ul>	<p>Encefalitis: &lt; 1 %                      Orquitis o inflamación de los testículos: 20 % (en hombres tras la pubertad)                      Índice de mortalidad: 1/10000</p>	<p>1/1millón</p> <p>-</p>	<p>Vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubeola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/10: malestar general con fiebre y en ocasiones sarpullido</li> <li>• Hasta 1/100: infección de las glándulas salivales</li> <li>• 5/100: inflamación de los ganglios</li> <li>• 1/20000-30000: disminución de plaquetas</li> <li>• 0-3/100 reacciones en las articulaciones en niños</li> </ul>
<p>Infección por meningococo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enfermedad bacteriana grave que puede manifestarse en forma de meningitis, encefalitis o septicemia generalizada.</li> </ul>	<p>Lesiones permanentes: 30 % (sordera, problemas motores y problemas de aprendizaje y comportamiento)                      Índice de mortalidad: 20 %</p>	<p>-</p>	<p>Vacuna contra el meningococo C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/10: inflamación local, enrojecimiento, dolor o fiebre.</li> <li>Disminución del apetito</li> </ul>