

# Обща схема на препоръчваните имунизации

Имунизация срещу	8 седмици	12 седмици	16 седмици	12 месеца	15 месеца <sup>(1)</sup>	5-7 години	10-13 години <sup>(4)</sup>	14-16 години
Полиомиелит								
Дифтерит								
Тетанус								
Пертусис (коклюш)								
Хемофилус инфлуенца В (възпаление на озъчната кора)								
Хепатит В (жълтеница)								
Пневмококи 13-валентна <sup>(1)</sup>								
Ротавирус <sup>(2)</sup>								
Морбили								
Паротит								
Рубеола								
Менингококи тип С или ACWY <sup>(3)</sup> (възпаление на мозъчната ора)								
Човешки папиломен вирус <sup>(4)</sup>								

- безплатна
- не е безплатна
- комбинирана ваксина: 1 спринцовка

(1) При гестационна възраст под 37 седмици:

- на възраст 12 седмици се дава допълнителна доза срещу пневмококи.
- ваксините за 15 месеца се дават на 13 месеца.

(2) Ротавирусната ваксина струва около 12 евро, с рецепта от лекар. Съхранява се в хладилник (2-8°C). Необходими са 2 или 3 дози, в зависимост от марката.

(3) Висшият здравен съвет препоръчва имунизация срещу менингококи ACWY вместо само срещу менингококи С. Ваксината ACWY струва около 53 евро, с рецепта от лекар. Съхранява се в хладилник (2-8°C).

(4) 1-ва година от средното образование. 2 дози в интервал от 6 месеца.

## Специални аспекти:

„Дете и семейство“ (Kind en Gezin) силно препоръчва прилагане на тази пълна схема, предложена от Висшия здравен съвет на Белгия.

По закон само полиоваксината е задължителна.

За поставянето на ваксината можете свободно да избирате между детската консултация на „Дете и семейство“ (Kind en Gezin), личния лекар или педиатър.

Освен ваксините от тази основна схема има и други ваксини, които можете да дадете за индивидуална защита на детето си, напр. срещу менингококи В, дребна шарка и хепатит А. Консултирайте се за това с лекуващия лекар.