

## برنامه عمومی واکسنهای توصیه شده

واکسن برای مقابله با	هفتگی 8	یگت فاه 12	یگت فاه 16	یگه ام 12	ماهگی 15 <sup>(1)</sup>	سالگی 5-7	سالگی 10-13 <sup>(4)</sup>	سالگی 14-16
فلج اطفال								
دیفتری								
کزاز								
سیاه سرفه								
آنفلوآنزای هموفیلی نوع ب (آماس مغزی)								
هپاتیت ب (زردی)								
پنوموکوکی 13 <sup>(1)</sup> سروتیپ 13								
ویروس روتا <sup>(2)</sup>								
سرخک								
اوریون								
سرخچه								
ACWY <sup>(3)</sup> یا C مننگوکوک نوع (آماس مغزی)								
ویروس پاپیلوم انسانی								

- رایگان
- غیر رایگان
- واکسن ترکیبی: 1 تزریق

اگر کمتر از 37 هفته باردار هستید (1)

- در 12 هفتگی دوز اضافه واکسن پنوموکوکی تجویز می شود.
  - واکسن ویروس روتا با نسخه پزشک حدود 12 یورو می باشد. در یخچال (دمای 2-8 درجه) نگهداری نمایید. صرف نظر از مارک واکسن، 2 تا 3 دوز نیاز می باشد.
  - با نسخه پزشک 53 یورو می ACWY را توصیه می نماید. هزینه واکسن C را بجای واکسن مننژیت ACWY شورای عالی بهداشت واکسن ترکیبی مننگوکوک (3) باشد. در یخچال (با دمای 2-8 درجه) نگهداری نمایید.
- سال اول دوره متوسطه. 2 دوز دیگر با 6 ماه فاصله از هم (4)

### نکات قابل توجه:

- موسسه کودک و خانواده قویاً توصیه می کند این برنامه تکمیلی، که از سوی شورای عالی بهداشت بلژیک مطرح شده، اعمال شود.
- از لحاظ قانونی فقط واکسن فلج اطفال اجباری است.
- علاوه بر واکسنهای برنامه اولیه واکسیناسیون، واکسنهای دیگری نیز جهت محافظت فردی از کودکان در برابر مننژیت نوع ب، آبله مرغان و هپاتیت آ وجود دارند.
- با پزشک معالجتان مشاوره نمایید.
- جهت واکسیناسیون می توانید انتخاب کنید که به موسسه کودک و خانواده، پزشک عمومی یا پزشک کودکان مراجعه نمایید.