

IMPfung GEGEN MENINGOKOKKEN: NEUE EMPFEHLUNG FÜR DIE IMPFUNG IM ALTER VON 15 MONATEN

Empfehlung

Der Hohe Gesundheitsrat empfiehlt, den kostenlosen Impfstoff gegen Meningokokken C (NeisVac-C®), der gegenwärtig bei der Konsultation im Alter von 15 Monaten verabreicht wird, durch den Impfstoff gegen Meningokokken ACWY (Nimenrix®) zu ersetzen. Dieser Impfstoff ist nicht kostenlos.

Meningokokken sind Bakterien. Es gibt verschiedene Typen, von denen die Typen A, B, C, W und Y für Menschen gefährlich sind. Sie können Hirnhautentzündung, Gehirnentzündung und Blutvergiftung verursachen.

Warum empfiehlt der Hohe Gesundheitsrat ACWY als Impfstoff gegen Meningokokken?

2018 gab es in Belgien (ebenso wie in unseren europäischen Nachbarstaaten) eine Zunahme von Infektionen mit Meningokokken der Serotypen W und Y. Die Gesamtzahl der Meningokokken-Infektionen bleibt gegenwärtig stabil. Das Risiko einer Meningokokken-Infektion ist zwar begrenzt, dennoch kann die Infektion sehr schwer verlaufen.

Warum wird der Impfstoff noch nicht in die kostenlose Grundimmunisierung aufgenommen?

Die Anzahl der Fälle nimmt gegenwärtig nur in beschränktem Maße zu. Deshalb wird der Impfstoff in Flandern kurzfristig noch nicht kostenlos zur Verfügung gestellt.

Unverbindlich

Als Elternteil haben Sie ein Anrecht auf diese Informationen. Daher fragen wir Sie unverbindlich, ob Sie diesen Impfstoff verabreichen möchten. In diesem Fall kann der Arzt des Konsultationsbüros diesen Impfstoff verordnen, um ihn bei der Konsultation im Alter von 15 Monaten statt des kostenlosen Impfstoffs gegen Meningokokken C zu verabreichen.

Preis

Der ACWY-Konjugatimpfstoff gegen Meningokokken ist in der Apotheke erhältlich und kostet 52,60 Euro. Sie holen den Impfstoff in der Apotheke mit einem Rezept des Arztes ab und bringen ihn zur Konsultation mit, die stattfindet, wenn Ihr Kind 15 Monate alt ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse, ob sie einen Teil der Kosten für den Impfstoff übernimmt. Lassen Sie sich in der Apotheke einen Beleg dafür geben.

Allgemeiner Plan der empfohlenen Impfungen

Impfung gegen	8 Wochen	12 Wochen	16 Wochen	12 Monate	15 Monate ⁽¹⁾	5-7 Jahre	10-13 Jahre ⁽⁴⁾	14-16 Jahre
Poliomyelitis								
Diphtherie (Krupp)								
Tetanus (Wundstarrkrampf)								
Pertussis (Keuchhusten)								
Haemophilus-influenzae-b (Hirnhautentzündung)								
Hepatitis B (Gelbsucht)								
Pneumokokken ⁽¹⁾ PVC13								
Rotavirus ⁽²⁾								
Masern								
Mumps (Ziegenpeter)								
Röteln (Rubella)								
Meningokokken Typ C oder ACWY ⁽³⁾ (Hirnhautentzündung)								
Humane Papillomaviren ⁽⁴⁾								

- kostenlos
- nicht kostenlos
- Kombinationsimpfung: 1 Spritze

- (1) Bei einer Schwangerschaftsdauer von weniger als 37 Wochen:
 - wird eine zusätzliche Dosis gegen Pneumokokken im Alter von 12 Wochen verabreicht;
 - werden die Impfungen im Alter von 15 Monaten auf 13 Monate vorverlegt.
- (2) Der Rotavirus-Impfstoff kostet ca. € 12 auf ärztliche Verordnung. Im Kühlschrank aufbewahren (2 bis 8 °C). Abhängig von der Marke sind 2 oder 3 Verabreichungen erforderlich.
- (3) Der Hohe Gesundheitsrat empfiehlt eine Impfung gegen Meningokokken ACWY statt nur gegen Meningokokken C. Der ACWY-Konjugatimpfstoff kostet ca. € 53 auf ärztliche Verordnung. Im Kühlschrank aufbewahren (2 bis 8 °C).
- (4) 1. Jahr des Sekundarunterrichts. 2 Verabreichungen mit einem Intervall von 6 Monaten.

Besondere Schwerpunkte

„Kind en Gezin“ empfiehlt ausdrücklich die Anwendung des vollständigen Impfplans, der vom Hohen Gesundheitsrat von Belgien vorgeschlagen wird. Laut Gesetz ist nur die Polio-Impfung obligatorisch.

Für die Verabreichung eines Impfstoffs haben Sie die freie Wahl zwischen dem Konsultationsbüro von „Kind en Gezin“ sowie Ihrem Haus- oder Kinderarzt.

Außer den Impfungen dieser Grundimmunisierung gibt es noch andere Impfstoffe für den individuellen Schutz Ihres Kindes, beispielsweise gegen Meningokokken B, Windpocken und Hepatitis A. Erkundigen Sie sich hierfür bei Ihrem Arzt.