

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ МЕНИНГОКОККОВ: НОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ В ВОЗРАСТЕ 15 МЕСЯЦЕВ

Рекомендация

Высший совет здравоохранения **рекомендует заменить** бесплатную **вакцину против менингококка С (NeisVac-C®)**, которая сейчас предоставляется при консультации по достижении возраста в **15 месяцев, вакциной против менингококков ACWY (Nimenrix®)**. Эта вакцина не бесплатна.

Менингококки представляют собой бактерии. Существуют различные их типы, из которых типы А, В, С, W и Y опасны для человека. Они могут вызвать менингит, воспаление мозга и заражение крови.

Почему вакцина против менингококков ACWY рекомендована Высшим советом здравоохранения?

В 2018 году в Бельгии, как и в соседних европейских странах, наблюдалось увеличение числа инфекций, вызванных менингококками серотипов W и Y. Общее число менингококковых инфекций в настоящее время остается стабильным. Вероятность менингококковой инфекции остается достаточно ограниченной, однако ее протекание может быть серьезным.

Почему вакцина больше не включается в бесплатную базовую схему вакцинации?

Рост числа случаев менингококковой инфекции остается ограниченным. Поэтому во Фландрии в ближайшее время вакцина не будет предоставляться бесплатно.

По собственной инициативе

Вы имеете право на получение этой информации в качестве родителя, поэтому мы задаем вопрос, желаете ли вы по собственной инициативе ввести эту вакцину. В этом случае врач консультации предпишет ввод вакцины на консультации по достижении возраста в 15 месяцев вместо бесплатной вакцины против менингококка С.

Стоимость

Вакцина против менингококков ACWY приобретается в аптеке и **стоит 52,60 евро. Вы можете приобрести ее в аптеке по рецепту** врача и принести на консультацию в 15 месяцев. Обратитесь в фонд взаимного медицинского страхования (мутуалитет) по вопросу возмещения стоимости вакцины. Для этого попросите в аптеке чек.

Общая схема рекомендуемых прививок

Вакцинация против:	8 неделя	12 неделя	16 неделя	12 месяцев	15 месяцев ⁽¹⁾	5-7 лет	10-13 лет ⁽⁴⁾	14-16 лет
Полиомиелит								
Дифтерия								
Столбняк								
Коклюш								
Гемофильная палочка типа b (менингит)								
Гепатит В (желтуха)								
Пневмококки ⁽¹⁾ 13 серотипов								
Ротавирус ⁽²⁾								
Корь								
Паротит (свинка)								
Краснуха								
Менингококки типов С или ACWY ⁽³⁾ (менингит)								
Вирус папилломы человека ⁽⁴⁾								

- бесплатно
- платно
- комбинированная вакцина: 1 укол

- (1) При длительности беременности менее 37 недель:
 - Вводится дополнительная доза вакцины против пневмококков в возрасте 12 недель.
 - Введение вакцин с 15 месяцев переносится на возраст 13 месяцев.
- (2) Вакцина от ротавируса стоит около 12 евро по рецепту врача. Ее необходимо хранить в холодильнике (2-8°C). Нужно 2 или 3 дозы в зависимости от марки вакцины.
- (3) Высший совет здравоохранения рекомендует вакцинацию против менингококков ACWY вместо вакцинации против менингококка С. Вакцина ACWY стоит около 53 евро по рецепту врача. Ее необходимо хранить в холодильнике (2-8°C).
- (4) Первый класс средней школы. 2 дозы с промежутком в 6 месяцев.

Пункты особого внимания:

«Ребенок и семья» настоятельно рекомендует полностью следовать этой схеме, предложенной Высшим советом здравоохранения Бельгии. По закону обязательна только вакцинация от полиомиелита.

Для проведения вакцинации вы можете свободно выбирать между консультацией «Ребенок и семья», вашим домашним врачом или педиатром.

Кроме прививок из этой базовой схемы существуют также и другие прививки, которые вы можете сделать ребенку для его защиты, например, от менингококка В, ветряной оспы и гепатита А. Посоветуйтесь с наблюдающим его врачом.