

# VAKCINÁCIA PROTI MENINGOKOKOM: NOVÉ ODPORÚČANIE PRE OČKOVANIE V 15 MESIACHOCH

## Odporúčanie

Vysoká zdravotnícka rada odporúča nahradiť bezplatnú **vakcínu proti meningokokom C** (NeisVac-C®), ktorá sa teraz podáva počas konzultácie vo veku 15 mesiacoch **vakcínou proti meningokokom ACWY** (Nimenrix®). Táto vakcína nie je zadarmo. Meningokoky sú baktérie. Existujú rôzne typy, medzi ktorými typy A, B, C, W a Y sú pre človeka nebezpečné. Môžu spôsobiť meningitídu, zápal mozgu a otravu krvi.

## Prečo je ACWY-vakcína proti meningokokom odporúčaná Vysokou zdravotníckou radou?

V roku 2018 došlo v Belgicku (rovnako ako v susedných európskych krajinách) k nárastu meningokokových infekcií spôsobených sérotypmi W a Y. Celkový počet meningokokových infekcií zostáva v súčasnosti stabilný. Náhoda meningokokovej infekcie zostáva obmedzená, ale môže byť veľmi vážna.

## Prečo ešte nie je vakcína zahrnutá do bezplatného základného programu?

Nárast počtu prípadov je v súčasnosti obmedzený. Z tohto dôvodu nie je očkovacia látka vo Flámsku v krátkom čase bezplatne dostupná.

## Bez záväzku

Ako rodič máte na tieto informácie nárok, preto sa bez záväzku pýtame, či chcete, aby táto vakcína bola podaná. V takom prípade lekár konzultačného centra môže predpísať podanie vakcíny po konzultácii v 15-ich mesiacoch namiesto bezplatnej vakcíny proti meningokokom C.

## Cena

Meningokoková vakcína ACWY je k dispozícii v lekárňach a **stojí 52,60 eur**. **Vyberiete si ju v lekárni na lekársky predpis** a v 15-ich mesiacoch si ju prineste na konzultáciu. Informujte sa v zdravotnej poisťovni, či je nejaká časť z kúpnej ceny tejto vakcíny preplácaná. Požiadajte o účtenku v lekárni

# Všeobecný harmonogram odporúčaných očkovaní

Vakcinácia v	8-ich týždňoch	12-ich týždňoch	16-ich týždňoch	12-ich mesiacoch	15-ich mesiacoch <sup>(1)</sup>	5-7-ich rokoch	10-13-ich rokoch <sup>(4)</sup>	14-16-ich rokoch
Detská obrna								
Záškrt (diftéria)								
Tetanus (strnulosť šije)								
Pertussis (čierny kašeľ)								
Haemophilus Influenzae B (meningitída), Hepatitída B (žltáčka)								
Pneumokoky <sup>(1)</sup> 13 sérotypov								
Rotavírus <sup>(2)</sup>								
Osýpky								
Prúšnice (zápal príušných žliaz)								
German measles (rubella)								
Meningokoky typu C alebo ACWY <sup>(3)</sup> (meningitída)								
Ľudský papilomavírus <sup>(4)</sup> Všeobecný harmonogram								

- zdarma
- nie zdarma
- kombinovaná vakcína: 1 injekcia

- (1) S gestačným vekom menej ako 37 týždňov:
  - Sa podáva extra dávka proti pneumokokom vo veku 12 týždňov.
  - Vakcíny podávané v 15 mesiacoch sú posunuté na podávanie v 13 mesiacoch.
- (2) Rotavírusová vakcína stojí na lekársky predpis okolo 12 €. Uchovávať v chladničke pri teplote (2 - 8°C). V závislosti od značky sú potrebné 2 alebo 3 dávky.
- (3) Vysoká zdravotnícka rada odporúča vakcináciu proti ACWY-meningokokom namiesto vakcinácie len proti meningokokom C. ACWY-vakcína stojí na predpis približne 53 €. Uchovávať v chladničke pri teplote (2-8°C).
- (4) 1. ročník stredoškolského vzdelávania. 2 dávky s intervalom 6 mesiacov.

## Body osobitnej pozornosti:

Dieťa a Rodina (poradenské stredisko pre deti v Belgicku-poznámka prekladateľa) dôrazne odporúča uplatňovanie tohto kompletného systému, ktorý navrhla Vysoká zdravotnícka rada Belgicka.

Z právneho hľadiska je povinná iba vakcína proti detskej obrne.

Pri podávaní vakcíny máte na výber medzi poradenským strediskom pre deti, vaším obvodným lekárom alebo detským lekárom.

Okrem vakcín z tohto základného harmonogramu existujú aj ďalšie vakcíny, ktoré môžete podať pre individuálnu ochranu vášho dieťaťa, napr. proti meningokokom B, proti ovčím kiahňam a hepatitíde A. Poradte sa so svojím ošetrojúcim lekárom.