

## Vaccinări

Acest tabel oferă o imagine de ansamblu a bolilor pentru care este recomandată vaccinarea în schema de vaccinare de bază. Complicațiile acestor boli sunt comparate cu cele ale vaccinării și sunt delimitate cu referire la posibilele efecte secundare ale vaccinării. În calitate de pacient(ă), puteți raporta efectele secundare ale medicamentelor, precum și ale vaccinurilor către Agenția Federală pentru Medicamente și Produse pentru Sănătate pe fagg.be.

Boala	Complicații grave		Efect secundar al vaccinului
	În caz de boală	În caz de vaccinare	
<b>Difterie (crup)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infecție severă a gâtului cu pericol de sufocare.</li> <li>• Bacteria eliberează o toxină care atacă nervii (paralizii) și poate duce la inflamația mușchilor cardiaci și la deces.</li> </ul>	Inflamația mușchiului cardiac: 5/10 Paralizie: 4-10/100 Rata mortalității: 20 % (până < 5 ani) 5-10 % (5-40 ani)	-	Vaccinul combinat hexavalent • 10 % inflamație locală, roșeață, durere sau febră. • În cazul administrării dozei de rapel la vârstă înaintată: uneori umflarea membrului. Acesta se vindecă complet după câteva zile.
<b>Tetanos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este cauzat de bacterii care sunt prezente în sol și în murdăria de pe străzi.</li> <li>• Provoacă spasme musculare. Poate evolua sever spre paralizia mușchilor respiratori, cauzând decesul.</li> </ul>	Rata mortalității: 10-80%	-	Vaccin combinat hexavalent • 10 % inflamație locală, roșeață, durere sau febră. • În cazul administrării dozei de rapel la vârstă înaintată: uneori umflarea membrului. Acesta se vindecă complet după câteva zile.
<b>Tusea convulsivă</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infecție a căilor respiratorii cu bacterie care produce toxine.</li> <li>• Accese exhaustive de tuse care pot duce la leziuni ale creierului din cauza insuficienței respiratorii.</li> </ul>	Sugari sub 1 an: Oprirea temporară a respirației: 60 % Pneumonie: 10 % Convulsii: 1-3 % Leziuni cerebrale: 1-3 % Leziuni permanente: 5 % Rata mortalității: 1%	-	Vaccinul combinat hexavalent • 10 % inflamație locală, roșeață, durere sau febră. • În cazul administrării dozei de rapel la vârstă înaintată: uneori umflarea membrului. Acesta se vindecă complet după câteva zile.

Boala	Complicații grave		Efect secundar al vaccinului
	În caz de boală	În caz de vaccinare	
<p>Poliomielită (paralizie infantilă)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paralizia apare la 1 din 100 de persoane infectate.</li> <li>• Aproape eliminată în toată lumea în urma vaccinării, cu excepția câtorva țări.</li> </ul>	<p>0,1-1 % paralizie Rata mortalității: 10-30 % în caz de paralizie</p>	-	<p>Vaccinul combinat hexavalent</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 % inflamație locală, roșeață, durere sau febră.</li> <li>• În cazul administrării dozei de rapel la vârstă înaintată: uneori umflarea membrului. Acesta se vindecă complet după câteva zile.</li> </ul>
<p>Hepatita B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infecție hepatică acută sau cronică.</li> <li>• Riscul de a dezvolta o infecție cronică: &lt; 1 an: 15-95 % 1-5 ani: 20-50 % &gt; 5 ani: 5-10 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 din 4 purtători cronici dezvoltă ciroză hepatică sau cancer hepatic</li> </ul>	-	<p>Vaccinul combinat hexavalent</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 % inflamație locală, roșeață, durere sau febră.</li> <li>• În cazul administrării dozei de rapel la vârstă înaintată: uneori umflarea membrului. Acesta se vindecă complet după câteva zile.</li> </ul>
<p>Haemophilus Influenzae tip b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cauza meningitei bacteriene, septicemie generalizată. Grupul de risc sunt în special copiii până la 4 ani.</li> </ul>	<p>Leziuni ale sistemului nervos: 15 %-30 % Surditate: 15 % Rata mortalității: 5 %</p>	- -	<p>Vaccinul combinat hexavalent</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 % inflamație locală, roșeață, durere sau febră.</li> <li>• În cazul administrării dozei de rapel la vârstă înaintată: uneori umflarea membrului. Acesta se vindecă complet după câteva zile.</li> </ul>

Boala	Complicații grave		Efect secundar al vaccinului
	În caz de boală	În caz de vaccinare	
<p>Infecția pneumococică</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumococul este o bacterie care există sub diferite tipuri.</li> <li>• Este o cauză importantă a meningitei bacteriene și a infecției urechii medii.</li> </ul>	<p>Septicemie generalizată, meningită, pneumonie. Rata mortalității: 30% în caz de meningită</p>		<p>Vaccinul pneumococic utilizat nu protejează împotriva tuturor tipurilor de pneumococ, dar protejează împotriva celor care cauzează boli grave și care se manifestă frecvent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/5 inflamație locală, roșeață, durere sau febră</li> <li>• Reacțiile adverse grave sunt rare.</li> </ul>
<p>Rotavirus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infecție care provoacă adesea diaree, vărsături și febră la copii mici și preșcolari.</li> <li>• Spitalizarea este uneori necesară din cauza deshidratării.</li> </ul>	<p>Deshidratare Rata mortalității: În țările occidentale: foarte scăzută</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 % diaree, vărsături</li> </ul>
<p>Rubeola (Pojarul roșu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De obicei, nu este gravă pentru copii, dar în cazul unei infecții în timpul sarcinii, există riscul de avort sau malformații congenitale</li> </ul>	<p>Deficit de trombocite: 1/3000 Encefalită: 1/6000 9/10 feți infectați în primul trimestru de sarcină cu malformații congenitale (surditate, orbire, defecte cardiace)</p>	<p>- -</p>	<p>Vaccinul combinat împotriva rujeolei-oreionului-rubeolei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/10: stare generală de rău și febră posibil cu erupții cutanate.</li> <li>• Până la 1/100: inflamație a glandelor salivare</li> <li>• 5/100: glande inflamate</li> <li>• 1/20000-30000: deficit de trombocite</li> <li>• 0-3/ 100 reacții la nivelul articulațiilor la copii</li> </ul>

Boala	Complicații grave		Efect secundar al vaccinului
	În caz de boală	În caz de vaccinare	
<p>Rujeola (pojarul)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boală foarte contagioasă, cu febră mare și pete roșii pe piele.</li> <li>• 1 din 5 (20 %) dezvoltă complicații</li> </ul>	<p>Pneumonie: 3,87,3 %                      Convulsii: 0,3-0,5 %                      Encefalită: 0,5-1 ‰                      Encefalită cronică progresivă: 0,5-2/100000                      Rata mortalității: 1-2,5/10.000</p>	<p>-</p> <p>0,02-190/100000 1/1 milion</p> <p>1/1 milion</p>	<p>Vaccinul combinat împotriva rujeolei-oreionului-rubeolei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/10 stare generală de rău și febră posibil cu erupții cutanate</li> <li>• Până la 1/100 inflamație a glandelor salivare</li> <li>• 5/100 glande inflamate</li> <li>• 1/20000-30000 deficit de trombocite</li> <li>• 0-3/100 reacții la nivelul articulațiilor la copii</li> </ul>
<p>Oreion (parotidită epidemică)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infecție virală care seamănă cu o răceală.</li> <li>• Caracteristice sunt glandele parotide inflamate.</li> </ul>	<p>Encefalită: &lt; 1 %                      Inflamația testiculelor (orhită): 20 % (la băieți după pubertate)                      Rata mortalității: 1/10000</p>	<p>1/1milion</p> <p>-</p>	<p>Vaccinul combinat împotriva rujeolei-oreionului-rubeolei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/10: stare generală de rău și febră posibil cu erupții cutanate.</li> <li>• Până la 1/100: inflamație a glandelor salivare</li> <li>• 5/100: glande inflamate</li> <li>• 1/20000-30000: deficit de trombocite</li> <li>• 0-3/ 100 reacții la nivelul articulațiilor la copii</li> </ul>
<p>Infecție meningococică</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boală bacteriană severă care se poate manifesta sub formă de meningită, encefalită sau septicemie generalizată.</li> </ul>	<p>Leziuni permanente: 30 % (surditate, probleme motorii și probleme de învățare și de comportament)                      Rata mortalității: 20%</p>	<p>-</p>	<p>Vaccinul meningococic conjugat de grup C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/10: inflamație locală, roșeață, durere sau febră</li> <li>Scăderea poftei de mâncare</li> </ul>