

Vaksinimet

Në këtë tabelë do të gjeni një përmbledhje të sëmundjeve për të cilat këshillohet vaksinimi sipas skemës së vaksinimit. Aty bëhet gjithashtu një krahasim mes ndërlikimeve të sëmundjeve të përmendura me ato të vaksinave dhe me efektet e mundshme anësore të vaksinimit. Pacienti mund të raportojë efektet anësore të ilaçeve dhe ato të vaksinave në Agjencinë Federale të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në faqen ueb fagg.be.

Sëmundja	Ndërlikime të rënda		Efekte anësore të vaksinës
	Të sëmundjes	Të vaksinës	
<p>Difteria (grykët e bardha)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infektim i rëndë i grykëve me rrezik serioz asfksie. • Bakteria çliron toksina që prekin sistemin nervor (paralizë) dhe mund të shkaktojë dëmtimin e muskujve të zemrës deri në vdekje. 	<p>Infeksion i muskujve të zemrës: 5/10 Paralizë: 4-10/100 Niveli i vdekshmërisë: 20 % (tek < 5-vjeçarët) 5-10 % (5-40 vjeçarët)</p>	-	<p>Vaksinë e kombinuar gjashtë herë • 10 % enjtje lokale, skuqje, dhimbje apo temperaturë. • Gjatë përsëritjes së dozës në moshë më të madhe: ndonjëherë mund të ketë enjtje gjymtyrësh. Kjo shërohet plotësisht pas disa ditësh.</p>
<p>Tetanozi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shkaktohet nga bakterie që gjenden në tokë dhe në papastërti në rrugë. • Shkakton spazma të muskujve. Mund të ketë pasoja të rënda të paralizës së muskujve të frymëmarrjes me pasojë vdekjen. 	<p>Niveli i vdekshmërisë: 10-80%</p>	-	<p>Vaksinë e kombinuar gjashtë herë • 10 % enjtje lokale, skuqje, dhimbje apo temperaturë • Gjatë përsëritjes së dozës në moshë më të madhe: ndonjëherë mund të ketë enjtje gjymtyrësh. Kjo shërohet plotësisht pas disa ditësh.</p>
<p>Kolla e mirë</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infeksion i rrugëve të frymëmarrjes nga bakterie që prodhojnë toksina. • Kollitje shumë të lodhshme e të rënda që mund të shkaktojnë dëmtim të trurit si pasojë e vështirësisë në frymëmarrje. 	<p>Bebet nën moshën 1 vjeç: Ndalim i përkohshëm i frymëmarrjes: 60 % Infeksioni i mushkërive: 10 % Konvulsione: 1-3 % Dëmtimi i trurit: 1-3 % Pasoja të përhershme: 5 % Niveli i vdekshmërisë: 1%</p>	-	<p>Vaksinë e kombinuar gjashtë herë • 10 % enjtje lokale, skuqje, dhimbje apo temperaturë • Gjatë përsëritjes së dozës në moshë më të madhe: ndonjëherë mund të ketë enjtje gjymtyrësh. Kjo shërohet plotësisht pas disa ditësh.</p>

Sëmundja	Ndërlikime të rënda		Efekte anësore të vaksinën
	Të sëmundjes	Të vaksinës	
<p>Poliomeliti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paraliza shfaqet 1 në 100/200 persona të infektuar. • Sajë vaksinimit poliomeliti është zhdukur gjithandej në botë, përveç disa vendeve. 	<p>0,1-1 % paralizë</p> <p>Niveli i vdekshmërisë: 10-30 % në rastin e paralizës</p>	-	<p>Vaksinë e kombinuar gjashtë herë • 10 % enjtje lokale, skuqje, dhimbje apo temperaturë • Gjatë përsëritjes së dozës në moshë më të madhe: ndonjëherë mund të ketë enjtje gjymtyrësh. Kjo shërohet plotësisht pas disa ditësh.</p>
<p>Hepatiti B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infeksion kronik dhe akut i mëlçisë. • Rrezikon zhvillimin e infeksionit kronik: < 1 vjeç: 15-95 % 1-5 vjeç: 20-50 % > 5 vjeç: 5-10 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 në 4 të infektuarve kronika zhvillon më tej cirrozë apo kancer të mëlçisë. 	-	<p>Vaksinë e kombinuar gjashtë herë • 10 % enjtje lokale, skuqje, dhimbje apo temperaturë • Gjatë përsëritjes së dozës në moshë më të madhe: ndonjëherë mund të ketë enjtje gjymtyrësh. Kjo shërohet plotësisht pas disa ditësh.</p>
<p>Haemophilus Influenzae tipi b</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shkaktar i, mes të tjerash, meningjitit bakterial, helmim i plotë i gjakut. Mosha më e rrezikshme është ajo e fëmijëve deri 4 vjeç. 	<p>Pasoja në sistemin nervor: 15 %-30 %</p> <p>Shurdhësi: 15 %</p> <p>Niveli i vdekshmërisë: 5 %</p>	-	<p>Vaksinë e kombinuar gjashtë herë • 10 % enjtje lokale, skuqje, dhimbje apo temperaturë • Gjatë përsëritjes së dozës në moshë më të madhe: ndonjëherë mund të ketë enjtje gjymtyrësh. Kjo shërohet plotësisht pas disa ditësh.</p>

Sëmundja	Ndërlikime të rënda		Efekte anësore të vaksinën
	Të sëmundjes	Të vaksinës	
<p>Infeksioni nga pneumokokut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pneumokoku është një bakterie e cila përbehet nga tipe të ndryshme. • Pneumokoku është shkaktar i rëndësishëm i meningjtit bakterial dhe infeksionit të veshit të mesëm. 	<p>Helmimi i gjakut, meningjiti, infeksioni i mushkërive.</p> <p>Niveli i vdekshmërisë: 30% në rastin e meningjtit</p>		<p>Vaksina që përdoret për infeksionin nga pneumokokut nuk mbron kundër të gjitha tipeve të pneumokokut por mbron kundër virusit shumë të përhapur dhe që shkakton sëmundje të rënda</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/5 enjtje lokale, skuqje, dhimbke amo temperaturë • Efektet anësore të rrezikshme janë të rralla.
<p>Rotavirusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infeksion që shkakton shpesh diarre, të vjella dhe temperaturë tek të vegjlit 2-4 vjeçarë. • Ndonjëherë shtrimi në spital është i nevojshëm për shkak të dehidratimit. 	<p>Dehidratimi</p> <p>Niveli i vdekshmërisë: Në vendet perëndimore: shumë i ulët</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 3 % diarre, të vjella
<p>Rubeola (Fruthi gjerman)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakonisht pa rrezik për fëmijët po në rast infeksioni gjatë shtatzanisë mund të ketë pasojë abortin apo fëmijë me defekt lindjeje. 	<p>Uje e rruazave të gjakut: 1/3000</p> <p>Infeksion i trurit: 1/6000 9/10 bebe të infektuara gjatë tremestrit të parë të shtatzanisë ka dëmtime lindjeje (si shurdhmëri, verbëri, probleme me zemrën)</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Vaksinë e kombinuar fruthi-shytat - rubeola</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/10: në përgjithësi pas vaksinës nuk ndihen mirë, kanë temperaturë dhe skuqje të lëkurës • 1/100: infeksion në gjendrën e pështymës • 5/100: enjtje e gjendrave • 1/20000-30000: mangësi të rruazave të gjakut • 0-3/100 dhimbje gjymtyrësh tek fëmijët

Sëmundja	Ndërlikime të rënda		Efekte anësore të vaksinën
	Të sëmundjes	Të vaksinës	
<p>Fruthi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sëmundje dhumë ngjitëse me temperaturë të lartë dhe shenja të kuqe në lëkurë. • 1 në 5 (20 %) ka ndërlikime 	<p>Infeksion në mushkëri: 3,87,3 % Konvulsione: 0,3-0,5 % Infeksioni në tru: 0,5-1 ‰ Infeksion progresiv, kronik i trurit: 0,5-2/100000 Niveli i vdekshmërisë: 1-2,5/10.000</p>	<p>-</p> <p>0,02-190/100000 1/1 milion</p> <p>1/1 milion</p>	<p>Vaksinë e kombinuar fruth-shytat - rubeola</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/10: në përgjithësi pas vaksinës nuk ndihen mirë, kanë temperaturë dhe skuqje të lëkurës • 1/100: infeksion në gjendrën e pështymës • 5/100: enjtje e gjendrave • 1/20000-30000: mangësi të rruazave të gjakut • 0-3/100 dhimbje gjymtyrësh tek fëmijët
<p>Shytat (parotiti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • infeksion viral që ngjan me ftohjenVirale. • Karakteristikë janë enjtje e gjendrave që prodhojnë pështymën zakonisht të atyre poshtë veshit. 	<p>Infeksioni në tru: < 1 % Infeksion i testikujve: 20 % (tek meshkujt pas adoleshencës) Niveli i vdekshmërisë: 1/10000</p>	<p>1/1miljoen</p> <p>-</p>	<p>Vaksinë e kombinuar fruth-shytat - rubeola</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/10: në përgjithësi pas vaksinës nuk ndihen mirë, kanë temperaturë dhe skuqje të lëkurës • 1/100: infeksion në gjendrën e pështymës • 5/100: enjtje e gjendrave • 1/20000-30000: mangësi të rruazave të gjakut • 0-3/100 dhimbje gjymtyrësh tek fëmijët
<p>infeksioni nga meningokoku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sëmundje bakteriale e rëndë e cila mund të shfaqet si meningjiti, infeksioni në tru apo helmim i gjakut. 	<p>Pasoja të përhershme: 30 % (shurdhmëri, probleme motorike, probleme në të mësuar dhe sjellje) Niveli i vdekshmërisë: 20%</p>	<p>-</p>	<p>Vaksina kundër infeksionit nga meningokoku C-</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/10: enjtje lokale, skuqje, dhimbje apo temperaturë. Humbje e oreksit.