






















































Skema e përgjithshme e vaksinimit të rekomanduar

Vaksinim kundër	8 javë	12 javë	16 javë	12 -muajsh	15 -muajsh ⁽¹⁾	5-7 vjeç	10-13 vjeç ⁽⁴⁾	14-16 vjeç
Poliomielit								
Difteri (grykët e bardha)								
Tetanos								
Pertussis (kollë e mirë)								
Haemophilus influenzae tip B (inflamacion i cipës së trurit)								
Hepatit B (verdhëza)								
Pneumokokët ⁽¹⁾ 13-serotipa								
Rotavirusi ⁽²⁾								
Fruth								
Parotit (shytat)								
Rubeolë								
Meningokokët e tipit C ose ACWY ⁽³⁾ (inflamacion i cipës së trurit)								
Virusi i papilomës njerëzore ⁽⁴⁾								

-  falas
-  kundrejt pagesës
-  vaksina e kombinuar: 1 injeksion

(1) Me moshë gestacionale më pak se 37 javë:

- Jepet një dozë shtesë kundër pneumokokëve në moshën 12-javëshe.
- Vaksinat e moshës 15-muajshe bëhen në moshën më të hershme 13-muajshe.

(2) Vaksina e rotavirusit kushton afërsisht 12 € dhe jepet me përshkrim të mjekut. Të ruhet në frigorifer në temperaturën (2-8°C) Në varësi të markës, janë të nevojshme 2 ose 3 doza.

(3) Këshilli i Lartë për Shëndetin rekomandon vaksinimin kundër meningokokëve ASWY, në vend të vaksinës kundër meningokokut të tipit C. Vaksina ACWY kushton afërsisht 53 €. Të ruhet në frigorifer në temperaturën (2-8°C)

(4) Viti i parë i arsimit të mesëm të ulët. 2 doza në një interval prej 6 muajsh.

Pika të veçanta në vëmendje:

Agjencia 'Fëmija dhe Familja' rekomandon fuqimisht zbatimin e kësaj skeme të plotë, të propozuar nga Këshilli i Lartë për Shëndetin në Belgjikë. E detyrueshme me ligj është vetëm kryerja e vaksinës së poliomielitit.

Për bërjen e vaksinës keni mundësinë e zgjedhjes së lirë midis qendrës konsultore 'Fëmija dhe Familja, mjekut të familjes ose pediatrit.

Përveç vaksinave të skemës bazë, ekzistojnë edhe vaksina të tjera që bëhen me qëllim të mbrojtjes së fëmijës tuaj nga meningokoku i tipit B, varicela dhe hepatiti A. Këshillohuni për këtë me mjekun tuaj.