

الجدول العام للقاحات الموصى بها

لقاح "تطعيم" ضد	أسابيع 8	12 أع و س أ	16 أع و س أ	12 أرهش	شهرًا ⁽¹⁾ 15	سنوات 5-7	سنة ⁴ 10-13	سنة 14-16
شلل الأطفال	✓	✓	✓		✓	✓		
(الدفتيريا) الحُتَّاق	✓	✓	✓		✓	✓		✓
(الكزاز) التيتانوس	✓	✓	✓		✓	✓		✓
البورديتيلة الشاهوقية (السعال الديك)	✓	✓	✓		✓	✓		✓
(B) المستدمية النزلية من النوع (التهاب السحايا)	✓	✓	✓		✓	✓		
(B) التهاب الكبد الوبائي من النوع (البرقان)	✓	✓	✓		✓	✓		
المكورات العنقودية الرئوية ⁽¹⁾ الأهماط المصلية 13	✓	✓ ⁽¹⁾	✓	✓				
فيروس الروتا ²⁾	✗	✗	✗				✓	
الحصبة				✓			✓	
(النكاف) إتهاب الغدة النكفية				✓			✓	
(الحميراء) الحصبة الألمانية				✓			✓	
أو C المكورات السحائية من النوع ACWY ⁽³⁾ (التهاب السحايا)					✓	✗		
فيروس الورم الحليمي البشري ⁴⁾							✓	

- مجاني
- غير مجاني
- لقاح مركب: حقنة واحدة

نقاط خاصة ينبغي التركيز عليها:

(Hoge Gezondheidsraad van België) بشدة بتطبيق هذا الجدول الأساسي الكامل للقاحات الذي اقترحه المجلس الأعلى للصحة في بلجيكا (Kind en Gezin) تُوصي مؤسسة الطفل والأسرة

من الناحية القانونية، فقط إعطاء لقاح شلل الأطفال يكون إلزاميًا

بالإضافة إلى اللقاحات الواردة في هذا الجدول الأساسي، هناك لقاحات أخرى يمكنك إعطاؤها لتوفير حماية فردية لطفلك، على سبيل المثال اللقاح المضاد لالتهاب المكورات (A) ولقاح جُدري الماء، ولقاح التهاب الكبد الوبائي من النوع (B) السحائية من النوع

استشر طبيبك المعالج في هذا الصدد

أو طبيب الأسرة الخاص بك، أو طبيب الأطفال (Kind en Gezin) لإعطاء اللقاح، لديك حرية الاختيار بين مركز تقديم المشورة التابع لمؤسسة الطفل والأسرة

(1) في حالة كان عمر الحمل أقل من 37 أسبوعًا

• تُعطى جرعة إضافية ضد المكورات العنقودية الرئوية في عمر 12 أسبوعًا

• يتم إعطاء لقاحات عمر الـ 15 شهرًا بشكل مبكر في عمر الـ 13 شهرًا

(2) (سعر لقاح فيروس الروتا حوالي 12 يورو بوصفة طبية "روشته". ويتم تخزينه في التلاجة (2-8 درجة مئوية

يلزم تناول جرعتين أو 3 جرعات، حسب نوع العلامة التجارية

(3) (C) بدلًا من إعطاء اللقاح المضاد لالتهاب المكورات السحائية من النوع ACWY بإعطاء لقاح المكورات السحائية (Hoge Gezondheidsraad) يُوصي المجلس الأعلى للصحة

(حوالي 53 يورو، ويتم الحصول عليه بوصفة طبية "روشته". ويتم تخزينه في التلاجة (2-8 درجة مئوية ACWY فقط. سعر لقاح

(4) في السنة الأولى من التعليم الثانوي. جرعتان مع فاصل 6 أشهر بينهما