













# Mes vaccinations

Kind en Gezin recommande de suivre le **calendrier vaccinal de base complet** proposé par le Conseil Supérieur de la Santé. La plupart des vaccins sont **gratuits**. La **vaccination antipoliomyélitique** est **une obligation légale**. Votre enfant peut être vacciné dans un **bureau de consultation** de Kind en Gezin, chez votre médecin généraliste ou votre pédiatre. Le médecin ou l'infirmier/infirmière notera ici et dans le dossier en ligne quels vaccins votre enfant a reçus et quand.

Vaccin contre	8 semaines	12 semaines	16 semaines	12 mois	15 mois
 <b>VACCIN COMBINÉ</b> <b>polio</b> (paralysie infantile) <b>diphthérie</b> (croup) <b>tétanos</b> (trismus) <b>pertussis</b> (coqueluche) <b>hépatite B</b> (jaunisse) <b>haemophilus influenzae type b</b> (méningite)					
 <b>pneumocoques</b> (méningite + pneumonie) Si l'âge gestationnel est inférieur à <b>37 semaines</b> , une <b>dose supplémentaire</b> est administrée à l'âge de <b>12 semaines</b> .		Dose supplémentaire pour les prématurés			
 <b>rotavirus</b> (gastro-entérite) Le vaccin contre le rotavirus est administré par voie orale et coûte environ <b>12 euros sur prescription médicale</b> . Conserver au réfrigérateur (2-8 °C). 2 ou 3 doses sont nécessaires, selon la marque.			 Dose supplémentaire lors de l'utilisation de Rota Teq®		
 <b>VACCIN COMBINÉ</b> <b>polio</b> (paralysie infantile) <b>diphthérie</b> (croup) <b>tétanos</b> (coqueluche) <b>hépatite B</b> (jaunisse) <b>haemophilus influenzae type b</b> (méningite)					
 <b>pneumocoques</b> (méningite + pneumonie)					
 <b>VACCIN COMBINÉ rougeole oreillons rubéole</b>					
 <b>méningocoques ACWY</b> (méningite)					

 Seuls les vaccins portant cette icône sont payants. Tous les autres sont gratuits.

 Sans objet à cet âge.