

Schema generală de vaccinări recomandate

Vaccin împotriva	8 săptămâni	12 săptămâni	16 săptămâni	12 luni	15 luni ⁽¹⁾	5-7 ani	10-13 ani ⁽⁴⁾	14-16 ani
Poliomielită	[Vaccin combinat: 1 administrare]				[Vaccin combinat: 1 administrare]			
Difterie (crupă)	[Vaccin combinat: 1 administrare]				[Vaccin combinat: 1 administrare]	[Vaccin combinat: 1 administrare]		[Vaccin combinat: 1 administrare]
Tetanos	[Vaccin combinat: 1 administrare]				[Vaccin combinat: 1 administrare]	[Vaccin combinat: 1 administrare]		[Vaccin combinat: 1 administrare]
Pertussis (tuse convulsivă)	[Vaccin combinat: 1 administrare]				[Vaccin combinat: 1 administrare]	[Vaccin combinat: 1 administrare]		[Vaccin combinat: 1 administrare]
Haemophilus Influenzae B (meningită)	[Vaccin combinat: 1 administrare]				[Vaccin combinat: 1 administrare]			
Hepatita B (icter)	[Vaccin combinat: 1 administrare]				[Vaccin combinat: 1 administrare]			
Pneumococi ⁽¹⁾ 13 serotipuri	[Vaccin gratuit]	[Vaccin gratuit ⁽¹⁾]	[Vaccin gratuit]	[Vaccin gratuit]				
Rotavirus ⁽²⁾	[Vaccin contra cost]	[Vaccin contra cost]	[Vaccin contra cost]					
Pojar				[Vaccin gratuit]			[Vaccin gratuit]	
Oreion				[Vaccin gratuit]			[Vaccin gratuit]	
Rubeolă				[Vaccin gratuit]			[Vaccin gratuit]	
Meningococi tip C sau ACWY ⁽³⁾ (meningită)					[Vaccin gratuit]	[Vaccin contra cost]		
Virusul papilomavirus uman (HPV ⁽⁴⁾)							[Vaccin gratuit]	[Vaccin gratuit]

- gratuit
- contra cost
- vaccin combinat: 1 administrare

(1) În cazul unei durate a sarcinii de mai puțin de 37 de săptămâni:

- Se administrează o doză suplimentară împotriva pneumococilor la vârsta de 12 săptămâni.
- Vaccinurile de la vârsta de 15 luni se administrează anticipat la vârsta de 13 luni.

(2) Vaccinul împotriva rotavirusului costă aproximativ € 12, cu rețetă emisă de medic. A se păstra în frigider (2-8°C). Sunt necesare 2 sau 3 doze, în funcție de producător.

(3) Consiliul Sănătății recomandă vaccinarea împotriva meningococilor ACWY și nu doar a meningococului C. Vaccinul ACWY costă aproximativ € 53, cu rețetă emisă de medic. A se păstra în frigider (2-8°C).

(4) Primul an de ciclu secundar. 2 doze la interval de 6 luni.

Aspecte importante:

Kind en Gezin recomandă administrarea întregii scheme propuse de Consiliul Sănătății din Belgia. Doar vaccinul anti-poliomielită este obligatoriu prin lege.

Pentru administrarea vaccinurilor puteți alege între serviciile Kind en Gezin, cele ale medicului dvs. de familie sau cele ale pediatrului.

Pe lângă vaccinurile din această schemă de bază, mai sunt și alte vaccinuri pe care le puteți administra pentru protecția individuală a copilului dvs., de exemplu împotriva meningococului B, a varicelei și a hepatitei A. Consultați în acest scop medicul dvs. de familie.