
## ماذا ينبغي أن تفعل في حالة إصابة أحد أفراد أسرتك بحمى













## الحواشي السفلية

- 1. يتعين عليك قياس درجة حرارة الجسم إذا كنت قلقًا وإذا كان الطفل يتصرف بشكل غير طبيعي أو ينام أقل أو أكثر أو شهيته منخفضة أو منعدمة أو صعب المراس أو يلعب أقل أو لا يلعب على الإطلاق أو يبكي كثيرًا أو يبدو شاحبًا.
  - 2. قِس درجة الحرارة من المستقيم للأطفال حتى سن 3 سنوات.
- 3. إذا ظهرت بقع دقيقة تحت جلد الذراحين أو الساقين أو الجذع لا تختفي عند الضغط عليها، فذلك يشير إلى حدوث تسمم بالدم وتفاقم الإصابة بعدوى خطيرة للغاية.
  - 4. أصغر من 90 يومًا.
  - 5. أسباب قد تدعو للقلق: إذا كان الطفل مريضًا بطريقة أخرى أو أكثر مرضًا من المعتاد، أو إذا كانت حالته المرضية تتفاقم، أو إذا استمرت إصابته بحمى أكثر من 3 أيام متتالية.
    - 6. علامات عدم الراحة: البكاء، الألم، عدم الراحة، انخفاض الشهية، قلة النشاط.
  - 7. جرعة واحدة من شراب بار اسيتامول حسب وزن الطفل. في حالات استثنائية، يمكن اتباع مسار علاج مختلف بعد استشارة طبيب.