

## Calendario general de vacunas recomendadas

Vacuna contra	8 semanas	12 semanas	16 semanas	12 meses	15 meses <sup>(1)</sup>	5-7 años	10-13 años <sup>(4)</sup>	14-16 años
Poliomielitis								
Difteria (crup)								
Tétanos								
Tos ferina								
Haemophilus Influenzae B (meningitis)								
Hepatitis B (ictericia)								
Neumococos <sup>(1)</sup> 13-serotipos								
Rotavirus <sup>(2)</sup>								
Sarampión								
Parotiditis (paperas)								
Rubeola								
Meningococos tipo C o ACWY <sup>(3)</sup> (meningitis)								
Virus del papiloma humano <sup>(4)</sup>								

- gratuitas
- no gratuitas
- Vacuna combinada: 1 inyección

(1) Con una edad gestacional inferior a 37 semanas:

- Se administra una dosis extra contra el neumococo a las 12 semanas.
- Las vacunas se adelantan de los 15 a los 13 meses.

(2) La vacuna contra el rotavirus cuesta unos 12 €, y se administra bajo prescripción médica. Conservar en la nevera (2-8°C). Se necesitan 2 ó 3 dosis, dependiendo de la marca.

(3) El Hoge Gezondheidsraad recomienda vacunar contra los meningococos ACWY, en lugar de sólo contra meningococos C. La vacuna ACWY cuesta alrededor de € 53, bajo prescripción médica. Conservar en la nevera (2-8°C).

(4) 1er año de educación secundaria. 2 dosis con un intervalo de 6 meses.

### Puntos especiales de interés:

Kind en Gezin recomienda encarecidamente aplicar por completo el plan propuesto por el Hoge Gezondheidsraad van België (Consejo de Salud de Bélgica). Legalmente, sólo es obligatoria la vacuna antipoliomielítica.

Para la administración de una vacuna, usted puede elegir libremente entre el Centro de Salud Infantil de Kind en Gezin, su médico de familia o pediatra.

Además de las vacunas de este esquema básico, hay otras vacunas que usted puede suministrar para la protección individual de su hijo, por ejemplo, contra el meningococo B, la varicela y la hepatitis A. Consulte a su médico para obtener más información.