



Opgroeien



Kind en Gezin volgt het [Vlaams Vaccinatieprogramma](#). We raden aan om alle vaccins **op het aanbevolen moment** te geven. Stel vaccinaties dus best niet uit. Zo is je baby op tijd beschermd tegen ernstige infectieziekten.

Kind en Gezin noteert elke vaccinatie in Vaccinnet en in het Kindboekje.

EXTRA VACCINS OF PREVENTIEVE MIDDELEN

In dit overzicht staan vaccins of middelen die niet standaard door Kind en Gezin aangeboden worden.



Bespreek dit met je huis- of kinderarts. Die geeft uitleg, bekijkt samen met jou wat nodig is, maakt een schema, schrijft het vaccin of middel voor en staat in voor de toediening.



Vraag aan je mutualiteit of hospitalisatieverzekering of je recht hebt op een tussenkomst voor extra vaccins. Dit verschilt per verzekering.

Pneumokokken 20 (Prevenar 20)	Wat? Pneumokokken zijn een grote familie van bacteriën, met meer dan 100 types. Bij kinderen zijn ze vaak terug te vinden in de neus- en keelholte zonder ziek te maken. Soms veroorzaken ze wel ernstige ziekten, zoals hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Vaccin: Prevenar 20 beschermt tegen 20 types. Het vaccin uit het basisvaccinatieschema (Prevenar 13) beschermt tegen 13 types. Aanbevolen schema: op 8, 16 en 24 weken en 12 maanden voor alle kinderen, ook te vroeg geboren baby's. Terugbetaling? Nee Richtprijs: 67.78 € per vaccin. Voor het volledige schema is dat ongeveer 270 €. <i>Kind en Gezin kan dit vaccin toedienen in overleg met je arts. Je arts maakt alle voorschriften, dat kan tegelijk. Je brengt het vaccin mee volgens het aanbevolen schema van de Hoge Gezondheidsraad op 8 weken, 16 weken, 24 weken en 12 maanden. Spreek je met je arts een ander schema af? Dan is je arts verantwoordelijk voor dat schema.</i>
--	--

RSV-immunisatie (Beyfortus)	Wat? RSV is een virus dat de luchtwegen infecteert. RSV kan bij baby's soms ernstig verlopen met hospitalisatie tot gevolg. Vaccin of antistoffen: • Vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap (eenmalig RSV-vaccin Abrysvo) ○ OF • 1 injectie met antistoffen voor de baby (Beyfortus). Dit gebeurt in september of oktober, vlak voor het RSV-seizoen. Baby's die in het RSV-seizoen geboren worden, krijgen de injectie zo snel mogelijk na de geboorte, meestal al op de materniteit. • Sommige kinderen met een onderliggend probleem komen in aanmerking voor een immunisatie tijdens de tweede winter na hun geboorte. Bespreek dit met je huis- of kinderarts. Terugbetaling? Ja, onder voorwaarden. Vraag aan je arts of apotheker of je kind in aanmerking komt. Er is bijvoorbeeld geen terugbetaling als de moeder tijdens de zwangerschap al een RSV-vaccin kreeg. Richtprijs: 12,80 € of 8,50 € (indien terugbetaald) <i>Dit product kan enkel bij je huisarts, kinderarts of in het ziekenhuis toegediend worden.</i>
Meningokokken B (Bexsero)	Wat? Meningokokken zijn een grote familie bacteriën met verschillende types (A, B, C, W135, X, Y ...). Soms veroorzaken ze ernstige ziekten zoals hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Vaccin: Het basisvaccinatieschema beschermt tegen meningokokken A, C, W, Y. Bexsero biedt extra bescherming tegen type B. Aanbevolen schema: • 2 vaccins in het eerste levensjaar en later 1 extra vaccin. De eerste 2 vaccins kunnen gegeven worden op 8 en 16 weken OF 10 en 18 weken OF 12 en 20 weken. • Bespreek met je huis- of kinderarts of deze vaccins samen met de vaccins uit het basisvaccinatieschema gegeven worden. Als de vaccins samen worden toegediend, is de kans op koorts groter. Dan is het aangeraden om preventief paracetamol te geven.

	Het herhalingsdosis van het vaccin wordt tussen 11 en 14 maanden gegeven (met een interval van 6 maanden na het primaire schema). Terugbetaling? Nee Richtprijs: € 86,52 per vaccin. Voor het volledige schema is dat ongeveer € 260. <i>Dit vaccin kan enkel bij je huis- of kinderarts toegediend worden.</i>
Wind- of waterpokken (Varilrix of Varivax)	Wat? Windpokken geven meestal koorts en blaasjes. Meestal verloopt de ziekte mild. Soms kunnen kinderen er wel ernstig ziek van worden. Vaccin: Dit vaccin zit niet in het basisvaccinatieschema. Je kan het vaccin vanaf 12 maanden toedienen voor een bijkomende bescherming tegen windpokken. Aanbevolen schema: - Er zijn 2 dosissen nodig. Tussen de 2 dosissen zit minstens 4 weken (Varivax) of 6 weken (Varilrix). - Dit is een levend verzwakt vaccin. Geef het daarom bij voorkeur op hetzelfde moment als het MBR-vaccin of een ander levend verzwakt vaccin. Zo niet, wacht dan minstens 1 maand tussen de vaccins. Terugbetaling? Nee. Uitzonderlijk kunnen een bepaalde risicopatiënten een terugbetaling krijgen. Richtprijs: zonder terugbetaling: € 52 per vaccin. Voor het volledige schema is dat ongeveer € 104. <i>Dit vaccin kan enkel bij je huis- of kinderarts toegediend worden.</i>
Reisvaccinatie (o.a. hepatitis A, gele koorts ...)	Wat? Voor sommige reizen zijn extra vaccins nodig. Dat hangt af van waar je naartoe gaat en hoe je reist. Meer informatie op www.wanda.be. Terugbetaling? Nee <i>Deze vaccins kunnen enkel bij je huis- of kinderarts of erkende reiskliniek toegediend worden.</i>